

**MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA**

**Blisteris / PVH-alumīnija blisteris**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Paracetamol Accord 500 mg tabletes  
Paracetamolum

**2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS**

Accord

**3. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**4. SĒRIJAS NUMURS**

Lot

**5. CITA**

-

**INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KASTĪTE/ PVH-alumīnija blisteris**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Paracetamol Accord 500 mg tabletes

Paracetamolum

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)**

Katra tablete satur 500 mg paracetamola.

**3. PALĪGVIELU SARAKSTS**

**4. ZĀĻU FORMA UN SATURS**

Tablete

8 tabletes

10 tabletes

12 tabletes

16 tabletes

20 tabletes

24 tabletes

30 tabletes

32 tabletes

50 tabletes

56 tabletes

60 tabletes

100 tabletes

300 tabletes

**5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Nesakošļāt.

**6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

**SATUR PARACETAMOLU. NELIETOT CITAS PARACETAMOLU SATUROŠAS ZĀLES.**

**PĀRDOZĒŠANAS GADĪJUMĀ NEKAVĒJOTIES KONSULTĒJĒTIES AR ĀRSTU, PAT, JA JŪS JŪTĀTIES LABI, JO PASTĀV NOPIETNA, VĒLĪNA AKŅU BOJĀJUMA RISKS. UZMANĪGI IZLASIET KLĀT PIEVIENOTO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.**

**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

EXP

**9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30<sup>0</sup> C.

**10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS**

**11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Accord Healthcare B.V.  
Winthontlaan 200  
3526 KV Utrecht  
Nīderlande

**12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

15-0224

**13. SĒRIJAS NUMURS**

Lot:

**14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

Bezrecepšu zāles.

**15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**

Paracetamol Accord 500 mg tabletes lieto vieglu un vidēji stipru sāpju un/vai drudža simptomātiskai ārstēšanai.

**Ieteikumi par devām:**

Pieaugušie un bērni no 15 gadu vecuma (ķermeņa masa > 55 kg)

1 līdz 2 tabletes (500-1000 mg) vienā reizē, atkārtojot katras 4-6 stundas, ja nepieciešams, līdz 6 tabletēm (3000 mg) 24 stundu laikā.

Bērni no 6 līdz 9 gadu vecuma (ķermeņa masa 22-30 kg)

Puse tabletes vienā reizē, līdz 4-6 reizēm 24 stundu laikā.

Bērni no 9 līdz 12 gadu vecuma (ķermeņa masa 30-40 kg)

Viena tablete vienā reizē, līdz 3-4 reizēm 24 stundu laikā.

Bērni no 12 līdz 15 gadu vecuma (ķermeņa masa 40-55 kg)

Viena tablete vienā reizē (500 mg), maksimāli 4-6 reizes 24 stundu laikā.

Retāks lietošanas biežums dienā ir paredzēts jaunākajiem bērniem attiecīgajā vecuma grupā.

Tablet jānorij vesela ar lielu daudzumu ūdens. Var arī tableti izšķīdināt lielā ūdens daudzumā, labi samaisīt un izdzert.

- Paracetamol Accord 500 mg tabletes nav paredzētas lietošanai bērniem jaunākiem par 6 gadiem.
- Intervālam starp lietošanas reizēm jābūt vismaz 4 stundas.
- Nelietojiet kombinācijā ar citiem paracetamolu saturošiem līdzekļiem.
- Nepārsniedziet noteikto devu.
- Ja Jūsu sāpju un/vai drudzis simptomi atjaunojas, Jūs varat atkārtot ārstēšanu ar Paracetamol Accord 500 mg tabletēm.
- Paracetamol Accord 500 mg tabletēm ir daļējuma līnija vieglai laušanai, lietojot bērniem.

Ja sāpes ilgst vairāk nekā 5 dienas un drudzis vairāk par 3 dienām vai stāvoklis pasliktinās, vai ja parādās citi simptomi, ārstēšana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

## **16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ**

Paracetamol Accord 500 mg

## **17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS**

Nav piemērojams.

## **18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA**

Nav piemērojams.