

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**[Lietošanas sistēma: “stay•safe”]****1. ZĀĻU NOSAUKUMS**Bicavera 4,25 % glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs,
šķīdums peritoneālai dialīzei**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)**

1 l lietošanai sagatavotā šķīduma satur:

Kalcija hlorīda dihidrāts (<i>Calcii chloridum dihydricum</i>)	0,1838 g	Ca ²⁺	1,25 mmol
Nātrija hlorīds (<i>Natrii chloridum</i>)	5,786 g	Na ⁺	134 mmol
Nātrija hidroģenkarbonāts (<i>Natrii hydrogenocarbonas</i>)	2,940 g	Mg ²⁺	0,5 mmol
Magnija hlorīda heksahidrāts (<i>Magnesii chloridum hexahydricum</i>)	0,1017 g	Cl ⁻	103,5 mmol
Glikozes monohidrāts (<i>Glucosum monohydricum</i>)	46,75 g	HCO ₃ ⁻	34 mmol
(Glikoze) (<i>Glucosum</i>)	(42,5 g)	Gluk.	235,9 mmol

pH ≈ 7,4

Teor. osmolar.: 509 mOsm/l

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds, oglekļa dioksīds

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2000 ml x 4

2500 ml x 4

“stay•safe” { Lietošanas sistēma }

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un iepakojums ir nebojāts.

Tikai intraperitoneālai lietošanai. Šķīdumu nedrīkst lietot intravenozām infūzijām.

Lietot kā norādījis ārsts.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Nelietot pirms abi šķīdumi nav sajaukti.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Noņemiet iesaiņojumu tieši pirms lietošanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI , JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā līdz 4 °C.

Lietošanai sagatavoto šķīdumu izlietot 24 stundu laikā pēc sajaukšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPERĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPERĀTU(JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner-Straße 1,
61352 Bad Homburg v.d.H.,
Vācija

Pārstāvniecība:
SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", Tālrunis: +371 67 615 651

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reg. nr.:

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ**

bicavera 4.25% glucose, 1.25 mmol/l calcium

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

< PC: {numurs} [produkta kods]

SN: {numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas sistēmas vai cits valsts sistēmas numurs zāļu identifikācijai]>

19. CITA

Sterils un nesatur baktēriālos endotoksīnus.

Maiss ar diviem nodalījumiem

Jebkurš neizlietotais šķīdums ir jāizmet.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

[Lietošanas sistēma: „stay•safe”]

1. ZĀĻU NOSAUKUMSBicavera 4,25 % glikoze, 1,25 mmol/l kalcijs,
šķīdums peritoneālai dialīzei**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)**

1 l lietošanai sagatavotā šķīduma satur:

Kalcija hlorīda dihidrāts (<i>Calcii chloridum dihydricum</i>)	0,1838 g	Ca ²⁺	1,25 mmol
Nātrija hlorīds (<i>Natrii chloridum</i>)	5,786 g	Na ⁺	134 mmol
Nātrija hidroģenkarbonāts (<i>Natrii hydrogenocarbonas</i>)	2,940 g	Mg ²⁺	0,5 mmol
Magnija hlorīda heksahidrāts (<i>Magnesii chloridum hexahydricum</i>)	0,1017 g	Cl ⁻	103,5 mmol
Glikozes monohidrāts (<i>Glucosum monohydricum</i>)	46,75 g	HCO ₃ ⁻	34 mmol
(Glikoze) (<i>Glucosum</i>)	(42,5 g)	Gluk.	235,9 mmol

pH ≈ 7,4

Teor. osmolar.: 509 mOsm/l

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds, oglekļa dioksīds

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2000 ml

2500 ml

„stay•safe“ { Lietošanas sistēma }

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot tikai tad, ja šķīdums ir dzidrs un iepakojums ir nebojāts.

Tikai intraperitoneālai lietošanai. Šķīdumu nedrīkst lietot intravenozām infūzijām.

Lietot kā norādījis ārsts.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Nelietot pirms abi šķīdumi nav sajaukti.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Noņemiet iesaiņojumu tieši pirms lietošanas.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI , JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā līdz 4 °C.

Lietošanai sagatavoto šķīdumu izlietot 24 stundu laikā pēc sajaukšanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPERĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPERĀTU(JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Else-Kröner-Straße 1,
61352 Bad Homburg v.d.H.,
Vācija

Pārstāvniecība:
SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", Tālrunis: +371 67 615 651

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reģ. nr.:

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

[Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts]

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

19. CITA

Sterils un nesatur baktēriālos endotoksīnus.
Maiss ar diviem nodalījumiem
Jebkurš neizlietotais šķīdums ir jāizmet.