

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{Kastīte}

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

GASTROCYNESINE tabletes

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMI UN DAUDZUMI

Vienā tabletē ir šādas aktīvās vielas:

Abies nigra 4 CH	75 mg
Carbo vegetabilis 4 CH.....	75 mg
Nux vomica 4 CH	75 mg
Robinia pseudo acacia 4 CH.....	75 mg

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi, saharozi.
Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Tablete
60 tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

Pa 1 vai 2 tabletēm 15 minūtes pirms ēšanas. Ja nepieciešams, atkārtot pēc ēšanas.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti izšķīdiniet šķīdumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {...}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTAS ZĀLES VAI IZLIETOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA NEPIECIEŠAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

00-1116

13. SĒRIJAS NOSAUKUMS

Sērija {...}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Homeopātiskas zāles, ko lieto tādu gremošanas traucējumu kā smaguma sajūta un sāpes kuņģī, gāzu uzkrāšanās, grēmas, miegainība pēc maltītes, simptomātiskai ārstēšanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

gastrocynesine

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

PVH/alumīnija blisteri

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

GASTROCYNESINE

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BOIRON

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {...}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot {...}

5. CITA