

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

CORYZALIA apvalkotās tabletes

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto **CORYZALIA apvalkotās tabletes** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabāriet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas Jums jāsazinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir **CORYZALIA apvalkotās tabletes** un kādam nolūkam tās lieto
2. Pirms **CORYZALIA apvalkoto tablešu** lietošanas
3. Kā lietot **CORYZALIA apvalkotās tabletes**
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt **CORYZALIA apvalkotās tabletes**
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR CORYZALIA apvalkotās tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

CORYZALIA apvalkotās tabletes ir homeopātiskās zāles, ko lieto saaukstēšanās un rinīta simptomātiskai ārstēšanai.

2. PIRMS CORYZALIA apvalkoto tablešu LIETOŠANAS

Nelietojiet CORYZALIA apvalkotās tabletes šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām vai kādu citu **CORYZALIA apvalkoto tablešu** sastāvdaļu.

Īpaša piesardzība, lietojot CORYZALIA apvalkotās tabletes, nepieciešama šādos gadījumos

Tā kā zāles satur Pulsatilla, pacientiem ar oītu vai sinusītu šo līdzekli nevajadzētu lietot bez ārsta uzraudzības.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Līdz šim laikam mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Negatīva ietekme, lietojot **CORYZALIA apvalkotās tabletes**, nav zināma.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav novērota ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no CORYZALIA apvalkoto tablešu sastāvdaļām

Palīgviela ar zināmu iedarbību: saharoze.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT CORYZALIA apvalkotās tabletes

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

2 tabletes 4 reizes dienā

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti izšķīdināt nelielā šķidrums daudzumā.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: konsultējieties ar savu ārstu.

Šīs zāles nevajadzētu lietot ilgāk par 5 dienām.

Ja esat lietojis CORYZALIA apvalkotās tabletes vairāk nekā noteikts

Lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot CORYZALIA apvalkotās tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, **CORYZALIA apvalkotās tabletes** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālrunis: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT CORYZALIA apvalkotās tabletes

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot **CORYZALIA apvalkotās tabletes** pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko CORYZALIA apvalkotās tabletes satur

Vienā tabletē (300mg):

- Aktīvās vielas ir:

Allium cepa	3 CH.....0,333 mg
Belladonna	3 CH.....0,333 mg
Sabadilla	3 CH.....0,333 mg
Kalium bichromicum	3 CH.....0,333 mg
Gelsemium sempervirens	3 CH.....0,333 mg
Pulsatilla	3 CH.....0,333 mg

- Citas sastāvdaļas ir:

Saharoze, talks, akācija, magnija stearāts, želatīns, baltais vasks, karnaubas vasks

CORYZALIA apvalkoto tablešu ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes svars - 300 mg.

Iepakojumā 40 baltas, cilindriskas apvalkotās tabletes.

REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN RAŽOTĀJS

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA "G. Miežis Ārsts"

Mūkusalas iela 51,

Rīga, LV 1004

Tel/fakss: +371 67532498

Šī lietošanas instrukcija akceptēta 11/2013.