

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

### PRETSĒNĪŠU 10 mg/g GELS

Acidi undecylenici monoethanolamidum

**Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto **Pretsēnīšu 10 mg/g gels** rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 4 nedēļu laikā, Jums jāsažinās ar savu ārstu.
- Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir **Pretsēnīšu 10 mg/g gels** un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms **Pretsēnīšu 10 mg/g gela** lietošanas
3. Kā lietot **Pretsēnīšu 10 mg/g gelu**
4. Iespējamās **Pretsēnīšu 10 mg/g gela** blakusparādības
5. Kā uzglabāt **Pretsēnīšu 10 mg/g gelu**
6. Sīkāka informācija

#### **1. KAS IR Pretsēnīšu 10 mg/g gels UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO**

**Pretsēnīšu 10 mg/g gels** ir lokāls ārstniecības līdzeklis dermatomikožu ārstēšanai. Gela aktīvā viela – undecilēnskābes monoetanolamīds (UMEA) - apvieno sevī fungicīdas īpašības ar virsmas aktīvām īpašībām. Pateicoties tām, kā arī UMEA lipofilajam raksturam, propilēnglikola klātbūtnē UMEA iedarbojas uz ādas virsējos slāņos esošo patogēno mikrofloru, kā arī penetrē slimības skartajos ādas dziļākajos slāņos. Pretsēnīšu gels darbojas fungicīdi uz sekojošām sēnīšu kultūrām:

Epidermophyton sp.

Candida albicans

Microsporum canis

Trichophyton rubrum

UMEA bojā patogēno sēņu šūnu citoplazmatiskās membrānas, mainot to caurlaidību un šūnu eksistencei nepieciešamos apstākļus. UMEA ietekmē ergosterīna sintēzi sēņu šūnās.

## **2. PIRMS Pretsēnišu 10 mg/g gela LIETOŠANAS**

### **Nelietojiet Pretsēnišu 10 mg/g gelu šādos gadījumos**

- ja Jums ir paaugstināta jutība pret undecilēnskābes preparātiem vai kādu citu **Pretsēnišu 10 mg/g gela** sastāvdaļu;
- bērniem līdz 2 gadu vecumam.

### **Īpaša piesardzība, lietojot Pretsēnišu 10 mg/g gelu, nepieciešama šādos gadījumos**

- nelietot uz atklātām brūcēm vai gļotādām;
- nepieļaut gela nokļūšanu acīs. Ja tas noticis, skalot acis ar lielu daudzumu silta ūdens;
- nelietot zem neelpojošiem pārsējiem;
- jāseko ādas stāvoklim ap mikožu skarto ādas rajonu. Apsārtuma gadījumā lietošana jāpārtrauc.

### **Citu zāļu lietošana**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

### **Grūtniecība un zīdīšanas periods**

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības laikā lietot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu un rūpīgas riska – ieguvuma attiecības izvērtēšanas.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

**Pretsēnišu 10 mg/g gels** neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

### **Svarīga informācija par kādu no Pretsēnišu 10 mg/g gela sastāvdaļām**

Gela sastāvā iekļautā palīgviela propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu, palīgvielas propilparahidroksibenzoāts (E216) un metilparahidroksibenzoāts (E218) – alerģiskas reakcijas (visbiežāk lēna tipa).

## **3. KĀ LIETOT Pretsēnišu 10 mg/g gelu**

Vienmēr lietojiet **Pretsēnišu 10 mg/g gelu** tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Rītos un vakaros apstrādāt mikožu skartās vietas ar nelielu gela daudzumu (1 – 2 g), gelu viegli iemasējot ādā. Ārstēšanās kursa ilgums 2 – 4 nedēļas.

**Ja esat lietojis Pretsēnīšu 10 mg/g gelu vairāk nekā noteikts**

Tā kā aktīvā viela maz uzsūcas asinīs, maz ticams, ka, lietojot vietēji, zāles var pārdozēt. Tomēr nevar izslēgt noteiktu orgānu sistēmu vai visu organisma ietekmējošu blakusparādību (kontakdermatītu) rašanos. Ja tiek pārsniegta ieteicamā deva lietošanai uz ādas, liekais gela daudzums jānotīra.

**Ja esat aizmirsis lietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu**

Nelietojiet dubultdevu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

**Ja Jūs pārtraucat lietot Pretsēnīšu 10 mg/g gelu**

Ja Jums ir kādi jautājumi par **Pretsēnīšu 10 mg/g gela** lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Vienmēr nomazgājiet rokas pēc **Pretsēnīšu 10 mg/g gela** lietošanas, ja vien Jūs tās neārstējat. Cieši aiztaisiet iepakojumu.

**4. IESPĒJAMĀS Pretsēnīšu 10 mg/g gela BLAKUSPARĀDĪBAS**

Tāpat kā citas zāles, **Pretsēnīšu 10 mg/g gels** var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos novēro alerģiskas ādas reakcijas (kontakdermatītu), tādos gadījumos lietošana jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

**5. KĀ UZGLABĀT Pretsēnīšu 10 mg/g gelu**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt cieši noslēgtā tūbā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot **Pretsēnīšu 10 mg/g gelu** pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

**6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA**

**Ko Pretsēnīšu 10 mg/g gels satur**

- Aktīvā viela ir undecilēnskābes monoetanolamīds (Acidi undecylenici monoethanolamidum) 10 mg/g
- Citas sastāvdaļas ir propilēnglikols, etilspirts, metilparahidroksibenzoāts (E218), propilparahidroksibenzoāts (E216), karbomērs, trolamīns, attīrīts ūdens.

**Pretsēnīšu 10 mg/g gela ārējais izskats un iepakojums**

**Pretsēnīšu 10 mg/g gels** ir necaurspīdīgs gels no baltas līdz viegli pelēcīgai krāsai. Tas iepakots alumīnija tūbā pa 30 g. Tūba kopā ar lietošanas instrukciju ievietota kartona kastītē.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

SIA „LMP”

Vietalvas 1

LV-1009, Rīga

info@lmp.lv

**Šī lietošanas instrukcija atjaunota 11.2010.**

SIA „LMP” atbildīgā amatpersona

Ainārs Lagzdiņš

SIA „LMP” farmaceits

Mārtiņš Akermanis