

Grūtniecība: i.v. dzelzs preparātus nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Ja esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Jums nekavējoties jāsaazinās ar savu ārstu vai medmāsu, ja:

- Jums rodas kādi alerģiskas reakcijas simptomi i.v. dzelzs terapijas laikā vai neilgi pēc tās

Piemēram: nātrene vai izsitumi, nieze, reibonis, arī viegls reibonis; lūpu, mēles, rīkles vai ķermeņa pietūkums; apgrūtināta elpošana, elpas trūkums vai sēkšana.

Jūsu ārsts un medicīnas personāls ir informēts par šīm iespējamām blakusparādībām, un Jūs tiksiet uzraudzīts i.v. dzelzs ievadīšanas laikā un pēc tam.

Ziņošana par blakusparādībām

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Iedzīvotājiem”. Tālrunis informācijai: 67078400

Dzelzi saturošas zāles intravenozai lietošanai

Svarīga informācija pacientiem par iespējamu būtisku alerģisku reakciju risku, lietojot dzelzi intravenozi (i.v. - dzelzi ievada injekcijas vai infūzijas veidā vēnā)

Ferric derisomaltose, Ferric hydroxide dextran complex

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo bukletu un pārrunājiet visus jautājumus, kas Jums varētu rasties ar savu ārstu.

Jums jāizlasa arī pacientam paredzētā Lietošanas instrukcija, kas pievienota konkrētajam i.v. dzelzs preparātam, kas Jums ir parakstītas. Tā satur svarīgu papildu informāciju par zālēm.

Versija: v2.0
Datums: Janvāris, 2023

i.v. dzelzi lieto dzelzs deficīta ārstēšanai, ja iekšķīgi lietotie dzelzs preparāti nav iedarbojušies vai tos nevar lietot.

Ārstēšanas mērķis ir organisma dzelzs krājumu papildināšana.

i.v. dzelzs var izraisīt alerģiskas reakcijas. Nelielam skaitam pacientu šīs alerģiskās reakcijas var kļūt smagas vai dzīvībai bīstamas (paazīstamas kā anafilaktiskas reakcijas) un var izraisīt sirdsdarbības un asinsspiediena problēmas un/vai izraisīt ģīboni vai samaņas zudumu.

Jūs nedrīkstat saņemt i.v. dzelzs preparātu, ja:

- Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret šo produktu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu
- Jums iepriekš ir bijušas nopietnas alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas pret citu i.v. dzelzs terapiju*
- Jums ir dzelzs pārslodze (pārāk daudz dzelzs organismā)
- Jūsu anēmiju nav izraisījis dzelzs deficīts

Jums jāpastāsta savam ārstam, pirms viņš paraksta/ievada i.v. dzelzs preparātu, ja Jums ir kāda no šīm alerģijām vai stāvokļiem.

*** Ir svarīgi zināt, ka reakcija joprojām var notikt pat tad, ja Jums iepriekš nav bijušas problēmas ievadot i.v. dzelzs preparātus.**

Jums var būt paaugstināts alerģiskas reakcijas risks, ja Jums ir:

- zināmas alerģijas, tostarp alerģija pret zālēm
- smaga astma, ekzēma vai citas alerģijas slimības vēsturē (piemēram, pret putekļiem, ziedputekšņiem, dzīvnieku spalvām) vai
- imūnās sistēmas vai iekaisīgas slimības (piem., sistēmiskā sarkanā vilkēde, reimatoīdais artrīts).

Jums jāpastāsta savam ārstam, pirms viņš izraksta vai ievada i.v. dzelzs preparātu, ja Jums ir kāda no šīm alerģijām vai stāvokļiem.

Jūsu ārsts izlems, vai i.v. dzelzs preparāts Jums ir piemērots.