

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Atordapin 5 mg+10 mg apvalkotās tabletes Atordapin 10 mg+10 mg apvalkotās tabletes *amlodipinum/atorvastatinum*

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Atordapin un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Atordapin lietošanas
3. Kā lietot Atordapin
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Atordapin
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Atordapin un kādam nolūkam tās lieto

Atordapin tiek lietots, lai novērstu kardiovaskulārus notikumus (piemēram, stenokardiju, sirdslēkmi) pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, kuriem ir vēl citi kardiovaskulārā riska faktori, kā smēķēšana, palielināts ķermeņa svars, sirds slimības gadījumi ģimenē vai diabēts. Šie riska faktori kopā ar augstu asinsspiedienu pacientiem paaugstina kardiovaskulāro notikumu risku.

Atordapin ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas: amlodipīnu (kalcija antagonists) un atorvastatīnu (statīns), un tas tiek lietots gadījumos, kad Jūsu ārsts ir izvērtējis abu zāļu lietošanas nepieciešamību. Amlodipīnu lieto, lai ārstētu augstu asinsspiedienu (hipertensiju), un atorvastatīns samazina holesterīna līmeni.

Augsts asinsspiediens (hipertensija) ir klīnisks stāvoklis, kad regulāri tiek konstatēts ļoti augsts asinsspiediens, un tas ir viens no kardiovaskulāro notikumu (stenokardijas, sirdslēkmes, triekas) riska faktoriem.

Holesterīns ir dabīga viela organismā, kas nepieciešama normālai augšanai. Taču, ja holesterīna līmenis Jūsu asinīs ir pārāk augsts, tas nogulsņējas uz asinsvadu sienām, palielina asins trombu veidošanās un kardiovaskulāro notikumu risku. Tas ir viens no biežākajiem sirds slimību cēloņiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Atordapin lietošanas

Nelietojiet Atordapin šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret amlodipīnu vai atorvastatīnu, vai jebkuru citu kalcija kanālu blokatoru vai pret kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,
- ja Jums pašlaik ir slimība, kas ietekmē aknas (ja Jums agrāk ir bijusi slimība, kas ietekmē aknas, skatīt tālāk apakšpunktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”),
- ja Jums jebkad ir bijušas neizskaidrojamas novirzes asins analīzēs, kas parāda aknu funkciju,
- ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti,
- ja Jūs lietojat kādu no sekojošām zālēm: ketokonazolu, itrakonazolu (zāles, ko lieto sēnīšu vai mikožu infekciju ārstēšanai), telitromicīnu (antibiotisks līdzeklis),

- ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens (hipotensija),
- ja Jums ir sirds vārstuļa sašaurinājums (aortāla stenoze) vai kardiogēns šoks (stāvoklis, kad Jūsu sirds nespēj pietiekošā daudzuma piegādāt asinis ķermenim),
- ja Jūs pēc sirdslēkmes ciešat no sirds mazspējas,
- ja C hepatīta ārstēšanai Jūs lietojat glekaprevīra/pibrentasvīra kombināciju.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Atordapin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

- ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja,
- ja Jūs šobrīd lietojat vai pēdējo 7 dienu laikā esat lietojis pēdējo zāles, ko sauc par fuzidīnskābi (zāles bakteriālas infekcijas ārstēšanai) iekšķīgi vai injekciju veidā. Fuzidīnskābes un Atordapin kombinācija var izraisīt nopietnas muskuļu problēmas (rabdomiolīzi),
- ja Jums ir nieru darbības traucējumi,
- ja Jums ir samazināta vairogdziedzera funkcija (hipotireoze),
- ja Jums ir bijušas atkārtotas vai arī neizskaidrojamas izcelsmes smeldzoša rakstura muskuļu sāpes vai sāpes, vai Jūsu vai ģimenes anamnēzē ir iedzimtas muskuļu slimības,
- ja Jums iepriekš bijušas problēmas ar muskuļiem, ārstējoties ar citām holesterīnu (lipīdu) pazeminošām zālēm (piem., citiem statīniem vai zālēm, ko sauc par fibrātiem),
- ja Jūs regulāri lietojat daudz alkohola,
- ja Jums agrāk ir bijusi slimība, kas ietekmē Jūsu aknas,
- ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem,
- ja Jums agrāk ir bijis insults ar asinsizplūdumu smadzenēs vai Jums ir saglabājušies nelieli šķidruma norobežojumi smadzenēs no agrākiem insultiem.

Ja kāds no šiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, ārstam vajadzēs veikt asinsanalīzi pirms ārstēšanās ar Atordapin un varbūt arī tās laikā, lai laikus pamanītu blakusparādību risku saistībā ar muskuļu bojājumu. Zināms, ka muskuļu bojājuma paaugstināts risks, piemēram, rabdomiolīze, ir gadījumos, kad vienlaicīgi tiek lietotas noteiktas zāles (skatīt „Citas zāles un Atordapin”).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir pastāvīgs muskuļu vājums. Šī stāvokļa diagnostikai un ārstēšanai var būt vajadzīgi papildu izmeklējumi un zāles.

Ja Jums ir cukura diabēts vai cukura diabēta rašanās risks, šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs rūpīgi uzraudzīs. Ja Jums ir augsts cukura un tauku līmenis asinīs, liekā ķermeņa masa un augsts asinsspiediens, Jums ir iespējams cukura diabēta risks.

Bērni un pusaudži

Atordapin lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

Citas zāles un Atordapin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ir dažas zāles, kuras var mijiedarboties ar Atordapin. Šis mijiedarbības veids var padarīt vienu vai abas zāles mazāk efektīvas. Tāpat tās var palielināt blakusparādību risku vai arī to smaguma pakāpi, ieskaitot muskuļu masas zudumu, ko sauc par rabdomiolīzi un miopātiju (aprakstīti 4. punktā):

- dažas antibiotikas, piem., rifampicīns, fuzidīnskābe, makrolīdu antibiotikas, piemēram, eritromicīns, klaritromicīns, telitromicīns, vai dažas zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai, piemēram, ketokonazols, itrakonazols,
- zāles, kas regulē holesterīna līmeni: fibrāti (piem., gemfibrozils) vai holestipols,
- zāles, kas regulē sirds ritmu, piemēram, amiodarons, diltiazems un verapamils,
- zāles, ko lieto krampju novēršanai, piem., karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns, fosfenitoīns, primidons,
- zāles, ko lieto, lai ietekmētu imūnsistēmas darbību, piem., ciklosporīns, takrolīms, sirolīms, temsirolīms, everolīms,
- zāles, tādas kā ritonavīrs, lopinavīrs, atazanavīrs, indinavīrs, darunavīrs, tipranavīra/ritonavīra

- kombinācija, nelfinavīrs, ko lieto HIV ārstēšanai,
- dažas zāles, ko lieto C hepatīta ārstēšanai, piemēram, telaprevīrs, boceprevīrs un elbasvīra/grazoprevīra kombinācija,
- letermovīrs – zāles, kuras lieto, lai novērstu saslimšanu ar citomegalovīrusu,
- zāles, ko lieto depresijas ārstēšanai, piem., nefazodons un imipramīns,
- zāles, ko lieto psihisko slimību ārstēšanai, piem., neuroleptiskie līdzekļi,
- zāles, ko lieto sirds mazspējas ārstēšanai, piem., bēta blokatori,
- zāles, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai, piem. angiotensīna II antagonisti, AKE inhibitori, verapamils un diurētiskie līdzekļi,
- alfa blokatori, ko lieto augsta asinsspiediena un prostatas ārstēšanai,
- citas zāles, kuras mijiedarbojas ar Atordapin, tai skaitā ezetimībs (pazemina holesterīna līmeni), varfarīns (kavē asins sarecēšanu), perorālie kontraceptīvie līdzekļi, stiripentols (pretkrampju līdzeklis epilepsijas ārstēšanai), cimetidīns (grēmu un peptisku čūlu ārstēšanai), fenazons (pretsāpju līdzeklis), kolhicīns (lieto podagras ārstēšanai) un anticīdie līdzekļi (alumīniju un magniju saturošie līdzekļi gremošanas traucējumu novēršanai),
- amifostīns (lieto vēža ārstēšanai),
- sildenafilis (erektīlās disfunkcijas ārstēšanai),
- dantrolēns un baklofēns (muskulu relaksanti),
- steroīdi,
- ciklosporīns (imūnsupresants),
- asinszāli saturošas bezrecepšu zāles,
- ja Jums bakteriālu infekciju ārstēšanai jālieto iekšķīgi fuzidīnskābe, Jums uz laiku būs jāpārtrauc šo zāļu lietošana. Ārsts Jums pateiks, kad varēsiet atsākt lietot Atordapin. Atordapin un fuzidīnskābes lietošana retos gadījumos var izraisīt muskuļu vājumu, jutīgumu vai sāpes (rabdomiolīze). Sīkāku informāciju par rabdomiolīzi skatīt 4. punktā.

Ja Jūs jau lietojat citas zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, Atordapin var vēl vairāk pazemināt asinsspiedienu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot bezrecepšu zāles.

Atordapin kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Atordapin var lietot jebkurā dienas laikā, ēšanas laikā vai starp ēdienreizēm.

Greipfrūtu sula

Nedzeriet vairāk kā vienu vai divas glāzes greipfrūtu sulas dienā, jo liels daudzums greipfrūtu sulas var izmainīt Atordapin iedarbību.

Alkohols

Nedzeriet pārāk daudz alkohola, kamēr lietojat Atordapin. Sīkāku informāciju skatīt apakšpunktā „Bridinājumi un piesardzība lietošanā”.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Atordapin, ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai arī Jūs plānojat grūtniecību. Sievietēm dzemdētspējīgā vecumā Atordapin vai citu zāļu lietošanas laikā jālieto atbilstoša kontracepcijas metode. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus vai nelietojiet mehānismus, ja pēc zāļu lietošanas Jums reibst galva.

Atordapin satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".

3. Kā lietot Atordapin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie

Atordapin parastā sākuma deva pieaugušiem ir viena 5 mg+10 mg tablete vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, ārsts devu var palielināt līdz Atordapin 10 mg+10 mg tabletei vienu reizi dienā.

Atordapin tabletes jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Tabletes var lietot jebkurā dienas laikā gan kopā ar ēdienu, gan tukšā dūšā. Tomēr centieties katru dienu tabletes lietot vienā un tajā pašā laikā.

Svarīgi, lai Jūs ievērotu ārsta padomus par uzturu, īpaši par diētu ar samazinātu tauku saturu, izvairieties smēķēt un regulāri veiciet fiziskas aktivitātes.

Ja Jums liekas, ka Atordapin iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šīs zāles nav ieteicamas lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojis Atordapin vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz Atordapin tabletes (vairāk nekā Jūsu parastā dienas deva), sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko slimnīcu, lai saņemtu padomu. Paņemiet līdz palikušās tabletes un zāļu iepakojumu, lai mediķiem būtu skaidrs, kādas zāles Jūs esat lietojis.

Pārmērīgs šķidrums var uzkrāties plaušās (plaušu tūska), izraisot elpas trūkumu, kas var attīstīties 24-48 stundas pēc zāļu lietošanas.

Ja esat aizmirsis lietot Atordapin

Ja esat aizmirsis lietot paredzēto devu, nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Atordapin

Nepārtrauciet lietot Atordapin, kamēr ārsts Jums to neliek darīt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu vai Jūs vēlaties pārtraukt ārstēšanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāda no sekojošām nopietnām blakusparādībām, pārtrauciet lietot Atordapin un nekavējoties par tām pastāstiet ārstam:

- sejas, mēles un balsenes pietūkums, kas var izraisīt izteikti apgrūtinātu elpošanu,
- ja Jums ir neizskaidrojams muskuļu vājums, nepatīkamas sajūtas, sāpes, plīsums vai sarkani brūna urīna krāsa un īpaši, ja tajā pašā laikā Jūs jūtaties nevesels vai Jums ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (Ļoti retos gadījumos šo simptomu kombinācija kļūst par dzīvībai bīstamu stāvokli, ko sauc par rābdomiolīzi),
- vilkēdei līdzīgs sindroms (ieskaitot izsitumus, locītavu bojājumus un ietekmi uz asins šūnām).

Ļoti biežas blakusparādības, kas var izpausties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem, ietver:

- roku, plaukstu, kāju, locītavu vai pēdu tūska.

Biežas blakusparādības, kas izpaužas līdz 1 no 10 cilvēkiem, ietver:

- alerģiska reakcija,
- galvassāpes (it īpaši terapijas sākumā), reibonis, noguruma sajūta, miegainība,
- neregulāra sirdsdarbība, pietvīkums,
- sirdsklauves (sajūtama sirdsdarbība), elpas trūkums,
- deguna eju iekaisums, sāpes kaklā, deguna asiņošana,
- slikta dūša, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, izmaiņas zarnu darbībā (ieskaitot caureju, aizcietējumus un pastiprinātu gāzu izdalīšanos),
- muskuļu un locītavu sāpes, muskuļu krampji un spazmas, muguras sāpes, sāpes ekstremitātēs, muskuļu vājums,
- paaugstināts cukura līmenis asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, jāturpina rūpīgi kontrolēt cukura līmeni asinīs), paaugstināts kreatīnkināzes līmenis asinīs, izmaiņas asins analīžu rezultātos, kas norāda uz izmaiņām aknu darbībā,
- redzes traucējumi (ieskaitot redzes dubultošanos), neskaidra redze.

Retākas blakusparādības, kas izpaužas līdz 1 no 100 cilvēkiem, ietver:

- hepatīts (aknu iekaisums),
- izdalījumi no deguna, apetītes zudums, samazināts cukura līmenis asinīs (ja Jums ir cukura diabēts, jāturpina rūpīgi kontrolēt cukura līmeni asinīs), pieņemšanās svarā vai svara zudums,
- grūtfības iemigt, nakts murgi, garastāvokļa svārstības (ieskaitot nemieru), depresija, trīce, roku un kāju jušanas nervu bojājums (pazemināta jutība), atmiņas zudums,
- zvanīšana vai dūkoņa ausīs, ģibonis, pastiprināta svīšana, pazemināts asinsspiediens,
- sausums mutē, izmainīta garšas sajūta, vemšana, atraugas,
- matu izkrišana, zilumi vai sīki plankumi uz ādas, ādas krāsas izmaiņas, samazināta ādas jutība pret pieskārienu vai sāpēm, pirkstu un pēdu tirpšana vai dedzināšanas sajūta, izsitumi uz ādas, nātrene vai nieze,
- urinācijas traucējumi (ieskaitot pārmērīgu urināciju naktī un palielinātu urinācijas biežumu), impotence, krūts dziedzeru palielināšanās vīriešiem,
- diskomforta sajūta, pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas izraisa sāpes kuņģī), sāpes, sāpes kakla rajonā, sāpes krūškurvī,
- pozitīvs leukocītu tests urīna analīžu rezultātos,
- sirds ritma traucējumi,
- klepus.

Retas blakusparādības, kas izpaužas līdz 1 no 1000 cilvēkiem, ietver:

- redzes traucējumi,
- neizskaidrojama asiņošana vai zilumu veidošanās,
- smags muskuļu iekaisums, ļoti stipras sāpes muskuļos vai krampji, kas ļoti retos gadījumos var izraisīt rabdomiolīzi (muskuļu šūnu sabrukumu) un muskuļu šūnu sabrukums. Pārtraucot lietot Atordapin, ne visos gadījumos muskuļu šūnu sabrukums tiek apturēts un tas var būt dzīvībai bīstams un izraisīt nieru problēmas,
- trombocītu skaita samazināšanās asinīs,
- aknu bojājumi (ādas un acs ābolu dzeltēšana),
- smagas alerģiskas izcelsmes ādas reakcijas, ādas apsārtums, pūšļveida izsitumi, izteikta ādas lobīšanās, kas var strauji pārņemt visu ķermeni un var sākties ar gripai līdzīgiem simptomiem, ko pavada drudzis (toksiska epidermas nekrolīze),
- ādas dziļāko slāņu pietūkums - tai skaitā lūpu, plakstiņu un mēles pietūkums,
- skeleta muskuļu iekaisums vai pietūkums, ādas izsitumi ar čulgām, pēkšņs smags, plašs ādas pietūkums,
- cīpslas iekaisums, cīpslas plīsums,
- apmulsums.

Ļoti retas blakusparādības, kas izpaužas līdz 1 no 10000 cilvēkiem, ietver:

- alerģiska reakcija - simptomi var ietvert pēkšņu sēkšanu un sāpes vai smaguma sajūtu krūtīs, plakstiņu, sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkumu, apgrūtinātu elpošanu, kolapsu,
- ginekomastija (krūšu palielināšanās vīriešiem),
- samazināts balto asins šūnu skaits asinīs,
- muskuļu stīvums vai saspringums,
- sirdslēkme, sīko asinsvadu iekaisums, sāpes kuņģī (gastrīts),
- smaganu hiperplāzija,
- dzirdes zudums, aknu mazspēja,
- fotosensitivitāte (ādas paaugstināta jutība pret gaismu),
- sarkanai vilkēdei līdzīgs sindroms (tostarp izsitumi, locītavu bojājumi un ietekme uz asins šūnām).

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem:

- pastāvīgs muskuļu vājums,
- seksuāli traucējumi,
- depresija,
- elpošanas traucējumi, tostarp pastāvīgs klepus un/vai elpas trūkums vai drudzis,
- traucējumi, kas ietver stīvumu, trīci un/vai kustību traucējumus,
- diabēts. Tā iespējamība ir lielāka, ja Jums ir augsts cukura un tauku līmenis asinīs, ja Jums ir liekā ķermeņa masa un augsts asinsspiediens. Šo zāļu lietošanas laikā ārsts Jūs uzraudzīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Atordapin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Atordapin satur

- Aktīvās vielas ir amlodipīns un atorvastatīns.
Katra apvalkotā tablete satur 5 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 10 mg atorvastatīna (atorvastatīna kalcija trihidrāta veidā).
Katra apvalkotā tablete satur 10 mg amlodipīna (amlodipīna besilāta veidā) un 10 mg atorvastatīna (atorvastatīna kalcija trihidrāta veidā).
- Citas sastāvdaļas ir:
Tabletes kodols
polisorbāts 80, kalcija karbonāts, kroskarmelozes nātrija sāls, hidroksipropilceluloze,

mikrokristāliska celuloze, preželatinizēta kukurūzas ciete, magnija stearāts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds. Skatīt 2. punktu „Atordapin satur nātriju“.

5 mg + 10 mg tabletes apvalks

hipromeloze (6 cp), titāna dioksīds (E171), talks un propilēnglikols (E1520).

10 mg+10 mg tabletes apvalks

polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols 3000, talks and indigo karmīns (E132).

Atordapin ārējais izskats un iepakojums

Atordapin 5 mg+10 mg apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām. Tabletes izmērs: apmēram 6 mm.

Atordapin 10 mg+10 mg apvalkotās tabletes ir zilas, apaļas, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām. Tabletes izmērs: apmēram 6 mm.

Tabletes ir pieejamas blisteros pa 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 un 100 apvalkotajām tabletēm kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts	Zāļu nosaukums
Slovēnija	Amaloris
Bulgārija	Atordapin
Čehija	Atordapin
Igaunija	Amaloris
Spānija	Amlodipino/Atorvastatina Krka
Latvija	Atordapin
Polija	Atordapin
Portugāle	Amlodipina + Atorvastatina Krka
Slovākija	Atordapin

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2022

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras (www.zva.gov.lv) tīmekļa vietnē.