

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam**Travoprost/Timolol Stada 40 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums**
Travoprostum/Timololum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Travoprost/Timolol Stada un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Travoprost/Timolol Stada lietošanas
3. Kā lietot Travoprost/Timolol Stada
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Travoprost/Timolol Stada
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Travoprost/Timolol Stada un kādam nolūkam to lieto

Travoprost/Timolol Stada acu pilienu šķīdums ir divu aktīvo vielu (travoprosta un timolola) kombinācija. Travoprosts ir prostaglandīna analogs, kas palielina acs iekšējā šķidruma atteci, tādējādi samazinot acs iekšējo spiedienu. Timolols ir bēta blokators, kas samazina acs iekšējā šķidruma veidošanos. Abas sastāvdaļas darbojas kopīgi, samazinot acs iekšējo spiedienu.

Travoprost/Timolol Stada ir acu pilieni, ko lieto acs iekšējā spiediena pazemināšanai pieaugušajiem, tajā skaitā gados vecākiem cilvēkiem. Šis spiediens var izraisīt slimību, ko sauc par glaukomu.

2. Kas Jums jāzina pirms Travoprost/Timolol Stada lietošanas

NELIETOJIET Travoprost/Timolol Stada šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret travoprostu, prostaglandīniem, timololu, bēta blokatoriem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jums ir vai iepriekš ir bijuši elpošanas darbības traucējumi, piemēram, astma, smags hronisks obstruktīvs bronhīts (smaga plaušu slimība, kas var izraisīt sēkšanu, apgrūtinātu elpošanu un/vai ilgstošu klepu) vai cita veida elpošanas problēmas;
- ja Jums ir smags siena drudzis;
- ja Jums ir palēnināta sirdsdarbība, sirds mazspēja vai sirds ritma traucējumi (neregulāra sirdsdarbība);
- ja Jūsu acs virsma ir apduļķojusies.

Ja kāds no šiem stāvokļiem attiecas uz Jums, vaicājiet padomu ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Travoprost/Timolol Stada lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir vai iepriekš ir bijis(usi):

- koronārā sirds slimība (simptomi var ietvert sāpes vai spiedošu sajūtu krūškurvī, elpas trūkumu vai smakšanu), sirds mazspēja, pazemināts asinsspiediens;
- sirdsdarbības traucējumi, piemēram, palēnināta sirdsdarbība;
- elpošanas problēmas, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība;
- slikta asins apgāde (piemēram, Reino slimība vai Reino sindroms);
- diabēts, jo timolols var maskēt zema cukura līmeņa asinīs pazīmes un simptomus;
- pārāk aktīva vairogdziedzera darbība, jo timolols var maskēt vairogdziedzera slimības pazīmes

- un simptomus;
- *myasthenia gravis* (hronisks neiromuskulārs vājums);
- kataraktas operācija;
- acs iekaisums.

Ja Jums ir nepieciešams veikt jebkādu ķirurģisku operāciju, pastāstiet ārstam, ka lietojat Travoprost/Timolol Stada, jo timolols var izmainīt dažu zāļu, kuras lieto anestēzijas laikā, iedarbību.

Ja, lietojot Travoprost/Timolol Stada, rodas jebkāda nopietna alerģiska reakcija (izsitumi uz ādas, apsārtums vai nieze acī), tad, neatkarīgi no tās cēloņa, ārstēšana ar adrenalīnu var nebūt tik efektīva. Tādēļ, saņemot citu terapiju, ir svarīgi pastāstīt ārstam, ka Jūs lietojat Travoprost/Timolol Stada.

Travoprost/Timolol Stada var izmainīt varavīksnenes (acs krāsainās daļas) krāsu. Šāda krāsas izmaiņa var būt neatgriezeniska.

Travoprost/Timolol Stada var palielināt skropstu garumu, biezumu, krāsu un/vai skaitu, kā arī izraisīt nieerastu matiņu augšanu uz acu plakstiņiem.

Travoprosts var uzsūkties caur ādu, un tāpēc to nedrīkst lietot grūtnieces vai sievietes, kuras plāno grūtniecību. Ja zāles nonāk saskarē ar ādu, to nekavējoties nepieciešams nomazgāt.

Bērni

Travoprost/Timolol Stada nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Travoprost/Timolol Stada

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Jūs lietojat citas zāles, tajā skaitā citus acu pilienus glaukomas ārstēšanai, Travoprost/Timolol Stada var ietekmēt šo zāļu iedarbību un šīs zāles var ietekmēt Travoprost/Timolol Stada iedarbību. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat vai arī plānojat lietot:

- zāles asinsspiediena pazemināšanai;
- zāles sirds slimību ārstēšanai, tajā skaitā hinidīnu (lieto sirds slimību un dažu malārijas tipu ārstēšanā);
- zāles diabēta ārstēšanai vai antidepressantus, kas pazīstami kā fluoksetīns un paroksetīns.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Travoprost/Timolol Stada grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad ārsts to uzskata par nepieciešamu. Ja Jums iespējama grūtniecības iestāšanās, ārstēšanās laikā ar šīm zālēm jāizmanto efektīvas kontracepcijas metodes.

Nelietojiet Travoprost/Timolol Stada, ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Šīs zāles var nokļūt Jūsu pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc Travoprost/Timolol Stada lietošanas Jums var rasties īslaicīga redzes miglošanās. Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, kamēr šīs sūdzības nav izzudušas.

Travoprost/Timolol Stada satur benzalkonija hlorīdu

Šīs zāles satur 150 mikrogramus benzalkonija hlorīda katrā ml acu pielienu, šķīduma. Mīkstās kontaktlēcas var absorbēt Benzalkonija hlorīdu, un tas var mainīt kontaktlēcu krāsu. Pirms šo zāļu lietošanas Jums ir jāizņem kontaktlēcas, un tās jāievieto atpakaļ pēc 15 minūtēm.

Benzalkonija hlorīds var izraisīt acu kairinājumu, īpaši, ja Jums ir sausas acis vai radzenes (caurspīdīgs slānis acs priekšējā daļā) bojājumi. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums ir neparastas sajūtas acīs, durstīšanas sajūta vai sāpes acīs, konsultējieties ar ārstu.

Travoprost/Timolol Stada satur makroglicerīna hidroksistearātu 40

Šīs zāles satur makrogolģlicerīna hidroksistearātu 40, kas var izraisīt ādas reakcijas.

3. Kā lietot Travoprost/Timolol Stada

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.





Ieteicamā deva ir

Viens piliens slimajā acī(-s) vienu reizi dienā – no rīta vai vakarā. Lietojiet zāles katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Piliniet Travoprost/Timolol Stada abās acīs tikai tad, ja ārsts tā ir teicis. Lietojiet zāles tik ilgi, cik to ir noteicis ārsts.

Izmantojiet Travoprost/Timolol Stada tikai pilināšanai acīs.

Norādījumi par lietošanu

 <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tieši pirms pudelītes pirmās lietošanas atveriet iepakojumu atplēšot maisiņu (1. attēls). Izņemiet pudelīti un uzrakstiet uz etiķetes atvēlētajā vietā atvēršanas datumu. Sagatavojiet zāļu pudelīti un spoguli. Nomazgājiet rokas. Noskrūvējiet vāciņu.
 <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Apgrieziet pudelīti otrādi, turiet to starp īkšķi un pārējiem pirkstiem. Nedaudz atlieciet galvu atpakaļ. Ar tīru pirkstu pavelciet plakstiņu, līdz starp acu plakstiņu un aci veidojas „kabačiņa”. Tajā jāiepilina piliens (2. attēls). Pietuviniet pudelītes galu pēc iespējas tuvāk acij. Izmantojiet spoguli, ja tas palīdz.
 <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pudelītes pilinātājs nedrīkst pieskarties Jūsu acij, acu plakstiņiem vai kam citam. Tā var inficēt zāles. Viegli saspiediet pudelīti tā, lai izpilētu viens šo zāļu piliens (3. attēls).
 <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pēc šo zāļu lietošanas piespiediet pirkstu acs iekšējam kaktiņam deguna tuvumā, turot to piespiestu 2 minūtes (4. attēls). Tas palīdz izvairīties no šo zāļu izplatīšanās pārējā ķermenī. Ja Jums pilieni jālieto abās acīs, atkārtojiet iepriekšējās darbības otrā acī. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti. Lietojiet vienlaicīgi tikai vienu pudelīti. Neatveriet iepakojuma maisiņu, ja vēl nav nepieciešams lietot zāles. Lai izvairītos no infekcijām, pudelīte Jums jāiznīcina pēc 4 nedēļām, kopš pirmās atvēršanas reizes, un jāsāk lietot jauna pudelīte.

Ja piliens nav iekļuvis Jūsu acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja esat lietojis Travoprost/Timolol Stada vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat lietojis Travoprost/Timolol Stada vairāk nekā noteikts Izskalojiet visas zāles no acs ar siltu ūdeni. Līdz nākamajai parastajai devas lietošanas reizei vairāk nepiliniet zāles.

Ja esat aizmirsis lietot Travoprost/Timolol Stada

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Travoprost/Timolol Stada, nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Dienas deva nedrīkst būt lielāka par vienu pilienu slimajā(s) acī(s).

Ja pārtraucat lietot Travoprost/Timolol Stada

Ja Jūs pārtrauksiet Travoprost/Timolol Stada lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu, acs iekšējais spiediens netiks kontrolēts, kas var novest pie redzes zuduma.

Ja Jūs papildus Travoprost/Timolol Stada lietojat arī citus acu pilienus, ievērojiet 5 minūšu starplaiku starp Travoprost/Timolol Stada un citu zāļu lietošanu.

Ja Jūs lietojat mīkstās kontaktlēcas, nelietojiet pilienu laikā, kad kontaktlēcas ir acīs. Pirms ielikt atpakaļ kontaktlēcas, pēc pilienu lietošanas, nogaidiet 15 minūtes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautāji ar ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti Jūs varat turpināt lietot pilienus, ja vien blakusparādības nav smagas. Ja esat nobažījies, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Nepārtrauciet lietot Travoprost/Timolol Stada, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

Blakusparādības acīs:

Acis apsārtums.

Biežas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

Blakusparādības acīs:

Acis virsmas iekaisums ar virsmas bojājumu, sāpes acīs, neskaidra redze, redzes traucējumi, sausa acis, niezoša sajūta acī, diskomforta sajūta acī, acs kairinājuma pazīmes un simptomi (piemēram, dedzināšana, dzeloša sajūta).

Retākas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

Blakusparādības acīs:

Acis virsmas iekaisums, acs plakstiņu iekaisums, konjunktīvas tūska, pastiprināta skropstu augšana, varavīksnenes iekaisums, acs iekaisums, jutība pret gaismu, pavājināta redze, nogurušas acis, acu alerģija, acs pietūkums, pastiprināta asarošana, acs plakstiņa apsārtums, acs plakstiņa krāsas izmaiņas, tumšāka ādas krāsa (ap aci).

Vispārējas blakusparādības:

Alerģiska reakcija pret aktīvajām vielām, reibonis, galvassāpes, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, elpas trūkums, pastiprināta matiņu augšana, sekrēcija rīkles mugurējā daļā, ādas iekaisums un nieze, palēnināta sirdsdarbība.

Retas blakusparādības (var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

Blakusparādības acīs:

Plānāka acs virsma, acu plakstiņu dziedzeru iekaisums, acs asinsvadu bojājums, kreveļu veidošanās uz acu plakstiņiem, nepareizi novietotas skropstas, patoloģiska skropstu augšana.

Vispārējas blakusparādības:

Nervozitāte, neregulāra sirdsdarbība, matu izkrišana, balss traucējumi, apgrūtināta elpošana, klepus, rīkles kairinājums, nātrene, novirzes aknu funkcionālajos rādītājos, ādas krāsas izmaiņas, slāpes, nogurums, diskomforta sajūta degunā, iekrāsots urīns, sāpes roku plaukstās un kāju pēdās.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Blakusparādības acīs:

Noslīdējuši acu plakstiņi (padarot aci pusaizvērtu), iekritušas acis (acis izskatās dziļāk esošas), varavīksnenes (acs krāsainā daļa) krāsas izmaiņas.

Vispārējas blakusparādības:

Izsitumi, sirds mazspēja, sāpes krūškurvī, insults, ģībonis, depresija, astma, paātrināta sirdsdarbība, nejutība vai tirpšanas sajūta, sirdsklauves, apakšējo ekstremitāšu tūska, nepatīkama garša.

Papildus

Travoprost/Timolol Stada ir divu aktīvo vielu (travoprosta un timolola) kombinācija. Līdzīgi kā citas zāles, kas tiek lietotas acīs, travoprosts un timolols (bēta blokators) uzsūcas asinīs. Tā rezultātā iespējamas līdzīgas blakusparādības, ko novēro lietojot bēta blokatorus iekšķīgi vai injekciju veidā. Blakusparādību sastopamība pēc lietošanas acīs ir retāka, nekā pēc lietošanas iekšķīgi vai injekciju veidā.

Tālāk minētās blakusparādības ietver reakcijas, ko novēro lietojot bēta blokatoru grupas zāles acu slimību ārstēšanā, vai reakcijas, ko novēro, lietojot travoprostu atsevišķi.

Blakusparādības acīs

Acu plakstiņa iekaisums, radzenes iekaisums, asinsvadus saturoša slāņa, kas atrodas zem tīklenes, atslāņošanās, kas rodas pēc filtrēšanas operācijas un var izraisīt redzes traucējumus, samazināts radzenes jutīgums, radzenes erozija (acs ābola priekšējā slāņa bojājums), redzes dubultošanās, izdalījumi no acīm, tūska ap acīm, acu plakstiņu nieze, acu plakstiņa izgriešanās uz āru ar apsārtumu, kairinājumu un pastiprinātu asarošanu, neskaidra redze (acs lēcas apduļķošanās pazīme), acs daļas tūska (acs ābola asinsvadu apvalka), acs plakstiņu ekzēma, oreola parādība, samazināta acs jutība, pigmentācija acī, paplašinātas acu zīlītes, skropstu krāsas izmaiņas, skropstu struktūras izmaiņas, izmainīts redzes lauks.

Vispārējas blakusparādības

Ausu un labirinta bojājumi:

Reibonis ar griešanās sajūtu, zvanīšana ausīs.

Sirds un asinsrite:

Palēnināta sirdsdarbība, sirdsklauves, tūska (šķidrums uzkrāšanās), sirdsdarbības ritma vai ātruma izmaiņas, sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība ar elpas trūkumu un pēdu un kāju pietūkumu, ko rada šķidrums uzkrāšanās), sirdsdarbības ritma traucējumu paveids, sirdslēkme, pazemināts asinsspiediens, Reino sindroms, aukstas rokas un kāju pēdas, samazināta asins piegāde smadzenēm.

Elpošana:

Plaušu elpceļu sašaurināšanās (galvenokārt pacientiem ar esošu slimību), iesnas vai aizlikts deguns, šķaudīšana (alerģijas dēļ), apgrūtināta elpošana, asiņošana no deguna, deguna sausums.

Nervu sistēma un vispārēji traucējumi:

Grūtības iemigt (bezmiegs), nakts murgi, atmiņas zudums, halucinācijas, spēka un enerģijas zudums, trauksme (pārmērīgs emocionāls distress).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Garšas sajūtu traucējumi, slikta dūša, gremošanas traucējumi, caureja, sausums mutē, sāpes vēdera dobumā, vemšana un aizcietējums.

Alerģija:

Pastiprināti alerģijas simptomi, vispārējas alerģiskas reakcijas, tajā skaitā zemādas tūska, kas parādās tādās vietās, kā uz sejas un ekstremitātes, un var nosprostot elpceļus, izraisot apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu, lokalizēti un vispārēji izsitumi, nieze, pēkšņa, dzīvību apdraudoša alerģiska reakcija.

Āda:

Izsitumi uz ādas balti sudrabainā krāsā (psoriāzes veida izsitumi) vai psoriāzes pastiprināšanās, ādas lobīšanās, izmainīta matu struktūra, ādas iekaisums ar niezošiem izsitumiem un apsārtumu, matu krāsas izmaiņas, skropstu izkrišana, nieze, patoloģiska matu augšana, ādas apsārtums.

Muskulatūra:

Myasthenia gravis (muskulu traucējumi) pazīmju un simptomu pastiprināšanās, neparastas sajūtas, kas līdzīgas tirpšanai, muskuļu vājums/nogurums, muskuļu sāpes, kas nav saistītas ar fizisko aktivitāti, locītavu sāpes.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi:

Aprūtināta un sāpīga urinācija, urīna nesaturēšana.

Reproduktivitāte:

Seksuālā disfunkcija, samazināta dzimumtieksme.

Vielmaiņa:

Pazemināts cukura līmenis asinīs, paaugstināts prostatas vēža marķiera līmenis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Travoprost/Timolol Stada

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes, maisiņa un pudelītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pirms atvēršanas šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra. Uzglabāt pudelīti maisiņā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc pirmās atvēršanas šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Lai novērstu infekcijas rašanos, **pudelīte jāizmet pēc 4 nedēļām kopš pirmās atvēršanas**, un jālieto jauna pudelīte. Datumu, kad Jūs pirmo reizi atvērāt pudelīti, uzrakstiet tam paredzētajā vietā uz etiķetes un kastītes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Travoprost/Timolol Stada satur

- Aktīvās vielas ir travoprosts un timolols.
Viens ml šķīduma satur 40 mikrogramus travoprosta un 5 mg timolola (timolola maleāta veidā).
- Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds, makrogolģlicerīna hidroksistearāts 40, trometamols, dinātrijs edetāts, borskābe (E284), mannīts (E421), nātrijs hidroksīds (pH pielāgošanai) un attīrīts ūdens.

Travoprost/Timolol Stada ārējais izskats un iepakojums

Travoprost/Timolol Stada acu pilieni, šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains ūdens šķīdums, praktiski bez daļiņām, pieejams 5 ml plastmasas pudelītēs ar bezkrāsainu pilinātāju un baltu, necaurspīdīgu vāciņu un nodrošinājumu līdz pirmajai atvēršanai. Katra pudelīte ir iepakota maisiņā. Katra pudelīte satur 2,5 ml šķīduma.

Šīs zāles ir pieejamas šādos iepakojuma lielumos: 1, 3 vai 6 pudelītes kartona kastītēs.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 -18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

Ražotājs

Pharmathen SA, 6 Dervenakion Str., Pallini, 15351, Grieķija

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200, Bulgārija

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, Bad Vilbel, 61118, Vācija

Centrafarm Services B.V., Van de Reijtstraat 31-E, 4814 NE Breda, Nīderlande

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, Rijeka, 51000, Horvātija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Beļģija	Travoprost/Timolol EG 40microgram/ml + 5mg/ml oogdruppels, oplossing
Luksemburga	Travoprost/Timolol EG 40microgrammes/ml + 5mg/ml collyre en solution
Igaunija	Travoprost/Timolol Stada
Latvija	Travoprost/Timolol Stada 40 mikrogrami/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums
Lietuva	Travoprost/Timolol Stada 40 mikrogramų/ 5 mg/ml akių lašai, tirpalas
Vācija	Travoprost/Timolol AL 40 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung
Dānija	Travoprost/Timolol STADA 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning
Spānija	Travoprost/timolol STADA 40 microgramos/ml+ 5 mg/ml colirio en solución
Somija	Travoprost/Timolol STADA 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos
Francija	TRAVOPROST/TIMOLOL EG 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution
Itālija	Travoprost e Timololo EG
Nīderlande	Travoprost/Timolol CF 0,04/5 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Zviedrija	Travoprost/Timolol STADA 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2022.gada augustā.