

## Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

### Brinzolamide/Timolol Accord 10 mg/ml / 5 mg/ml acu pilieni, suspensija *Brinzolamidum/Timololum*

**Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

#### Šajā lietošanas instrukcijā

1. Kas ir Brinzolamide/Timolol Accord un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Brinzolamide/Timolol Accord lietošanas
3. Kā lietot Brinzolamide/Timolol Accord
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Brinzolamide/Timolol Accord
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

#### 1. Kas ir Brinzolamide/Timolol Accord un kādam nolūkam to lieto

Brinzolamide/Timolol Accord satur divas aktīvās vielas, brinzolamīdu un timololu, kas kopā iedarbojoties samazina spiedienu acī.

Brinzolamide/Timolol Accord lieto, lai ārstētu paaugstinātu acs iekšējo spiedienu, ko sauc arī par glaukomu vai okulāru hipertensiju, pieaugušiem pacientiem vecākiem par 18 gadiem un kam augsts asinsspiediens acī nevar tikt efektīvi kontrolēts ar kādu no sastāvdaļām atsevišķi.

#### 2. Kas Jums jāzina pirms Brinzolamide/Timolol Accord lietošanas

##### Nelietojiet Brinzolamide/Timolol Accord šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret brinzolamīdu, zālēm, ko sauc par sulfonamīdiem (piemēram zāles, ko lieto diabēta ārstēšanai, infekciju ārstēšanai un arī diurētiķi (urīndzenošas tabletes)), timololu, bēta-blokatoriem (zālēm, ko lieto asinsspiediena pazemināšanai vai sirds slimību ārstēšanai) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
- ja Jums pašlaik vai iepriekš ir bijušas elpošanas orgānu slimības, tādas kā astma, smagas formas ilgstošs obstruktīvs bronhīts (smags plaušu stāvoklis, kas var izraisīt sēkšanu, apgrūtinātu elpošanu un/vai ilgstošu klepu) vai cita veida elpošanas problēmas.
- ja Jums ir smags siena drudzis.
- ja Jums ir palēnināta sirdsdarbība, sirds mazspēja vai sirds ritma traucējumi (neregulāra sirdsdarbība).
- ja Jūsu asinīs ir pārāk daudz skābuma (stāvoklis, kas tiek dēvēts par hiperhlorēmisku acidozi).
- ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi.

#### Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojiet Brinzolamide/Timolol Accord tikai pilināšanai acī(-īs).

Ja rodas nopietnu reakciju vai paaugstinātas jutības pazīmes, pārtrauciet šo zāļu lietošanu un

konsultējieties ar ārstu.

Pirms Brinzolamide/Timolol Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir vai iepriekš ir bijis:

- koronārā sirds slimība (simptomi var būt sāpes krūtīs vai spiediena sajūta, elpas trūkums vai smakšana), sirds mazspēja, zems asinsspiediens;
- sirds ritma traucējumi, piemēram, palēnināta sirdsdarbība;
- elpošanas traucējumi, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība;
- asinsrites traucējumu slimības (piemēram, Reino slimība vai Reino sindroms);
- diabēts, jo timolols var maskēt zema glikozes līmeņa asinīs pazīmes un simptomus;
- vairogdziedzera hiperaktivitāte, jo timolols var maskēt vairogdziedzera slimības pazīmes un simptomus;
- muskuļu vājums (myasthenia gravis);
- pirms operācijas pastāstiet ārstam, ka Jūs lietojat Brinzolamide/Timolol Accord, jo timolols var mainīt dažu zāļu iedarbību, kas tiek lietotas anestēzijas laikā;
- ja Jums anamnēzē ir atopija (tendence uz alerģisku reakciju rašanos) un smagas alerģiskas reakcijas, Jūs varat būt jutīgāks pret alerģiskām reakcijām Brinzolamide/Timolol Accord lietošanas laikā un adrenalīns var nebūt tik efektīvs, lai ārstētu alerģisko reakciju. Saņemot citu terapiju, pastāstiet ārstam vai medmāsai, ka Jūs lietojat Brinzolamide/Timolol Accord;
- ja Jums ir aknu problēmas;
- ja Jums ir 'sausā acs' vai radzenes problēmas;
- ja Jums ir nieru problēmas;
- ja pēc brinzolamīda vai citu līdzīgu zāļu lietošanas Jums kādreiz ir bijuši smagi ādas izsitumi vai ādas lobīšanās, tūlznas un/vai čūlas mutē.

#### **Īpaša piesardzība, lietojot brinzolamīdu:**

Ir ziņots par nopietnām ādas reakcijām, tostarp Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi saistībā ar ārstēšanu ar brinzolamīdu. Pārtrauciet lietot brinzolamīdu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja novērojat kādu no simptomiem, kas saistīti ar šīm nopietnajām ādas reakcijām, kas aprakstītas 4. punktā.

#### **Bērni un pusaudži**

Brinzolamide/Timolol Accord nav ieteicama bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 18 gadu vecumu.

#### **Citas zāles un Brinzolamide/Timolol Accord**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Jūs lietojat citas zāles, tajā skaitā citus acu pilienus glaukomas ārstēšanai, Brinzolamide/Timolol Accord var ietekmēt šo zāļu iedarbību un šīs zāles var ietekmēt Brinzolamide/Timolol Accord iedarbību. Pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat vai plānojat lietot zāles asinsspiediena pazemināšanai, tādas kā parasimpatomimētiskos līdzekļus un guanetidīnu, vai citas sirds zāles, tajā skaitā hinidīnu (lieto, lai ārstētu sirds slimības un dažus malārijas veidus), amiodaronu vai citas zāles sirds ritma traucējumu ārstēšanai un glikozīdus sirds mazspējas ārstēšanai. Pastāstiet ārstam arī, ja Jūs lietojat vai plānojat lietot zāles diabēta ārstēšanai vai kuņģa čūlas ārstēšanai, pretsēnīšu, pretvīrusu vai antibiotiskos līdzekļus, vai antidepresantus, piemēram, fluoksetīnu un paroksetīnu.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs lietojat citus karboanhidrāzes inhibitorus (acetazolamīdu vai dorzolamīdu).

Lietojot vienlaicīgi Brinzolamide/Timolol Accord un adrenalīnu (epinefrīnu), reizēm ziņots par acs zīlītes paplašināšanos.

#### **Grūtniecība un barošana ar krūti**

Nelietojiet Brinzolamide/Timolol Accord, ja Jūs esat grūtniece, vai plānojat grūtniecību, ja vien ārsts uzskata to par nepieciešamu. Aprunājieties ar ārstu, pirms sākt lietot Brinzolamide/Timolol Accord.

Nelietojiet Brinzolamide/Timolol Accord, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, timolols var nokļūt mātes pienā. Pirms jebkuru zāļu lietošanas barošanas ar krūti laikā konsultējieties ar ārstu.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

**Nevadiet transportlīdzekļus vai nelietojiet ierīces, līdz redze noskaidrojas.** Jūs varat izjust īslaicīgu redzes miglošanos tūlīt pēc Brinzolamide/Timolol Accord iepilināšanas. Viena no aktīvajām sastāvdaļām var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama garīga modrība un/vai fiziska koordinācija. Ja Jums ir tāda ietekme, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, ievērojiet piesardzību.

### **Brinzolamide/Timolol Accord satur benzalkonija hlorīdu**

Šīs zāles satur 0,0033 mg benzalkonija hlorīda katrā pilienā, kas ir līdzvērtīgi 0,01% vai 0,1 mg/ml.

Brinzolamide/Timolol Accord satur konservantu benzalkonija hlorīdu, kas var absorbēties uz mīkstajām kontaktlēcām un tas var mainīt kontaktlēcu krāsu. Pirms šo zāļu lietošanas Jums ir jāizņem kontaktlēcas, un tās jāievieto atpakaļ pēc 15 minūtēm.

Benzalkonija hlorīds var izraisīt acu kairinājumu, it īpaši, ja Jums ir sausas acis vai radzenes (caurspīdīgs slānis acs priekšējā daļā) bojājumi. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums ir neparastas sajūtas acīs, durstīšanas sajūta vai sāpes acīs, konsultējieties ar ārstu.

## **3. Kā lietot Brinzolamide/Timolol Accord**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja nomaināt citus acu pilienus glaukomas ārstēšanai pret Brinzolamide/Timolol Accord, Jums jāpārtrauc lietot citas zāles un Brinzolamide/Timolol Accord lietošana jāuzsāk nākamajā dienā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Lai novērstu pudelītes pilinātāja galiņa un suspensijas inficēšanos, jāievēro piesardzība, lai ar pudelītes pilinātāja galiņu neaizskartu plakstiņus, apkārtējās vai citas virsmas. Kamēr nelietojat, uzglabājiet pudelīti cieši aizvērtu.

Sekojoši pasākumi ir lietderīgi, lai ierobežotu zāļu daudzumu, kas nonāk asinīs pēc acu pilienlietošanas:

- Turiet plakstiņu aizvērtu vienlaicīgi ar pirkstu viegli uzspiežot uz acs kaktiņa blakus degunam vismaz 2 minūtes ilgi.

**Ieteicamā deva ir viens pilienš slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.**

Piliniet Brinzolamide/Timolol Accord abās acīs, tikai tad, ja ārsts tā ir teicis. Lietojiet zāles tik ilgi, cik ārsts ordinējis.

### **Kā lietot**



1. attēls

2. attēls

3. attēls



- Paņemiet pudelīti un spoguli.
- Nomazgājiet rokas.
- Pirms lietošanas labi sakratiet.
- Noskrūvējiet vāciņu. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.
- Apgrieziet pudelīti otrādi, turot to starp īkšķi un rādītājpirkstu.
- Atlieciet galvu atpakaļ. Ar tīru pirkstu pavelciet plakstiņu, līdz starp plakstiņu un aci veidojas „kabatiņa”. Tajā jāiepilina piliens (1. attēls).
- Pietuviniet pudelīti pēc iespējas tuvāk acij. Izmantojiet spoguli, ja tas palīdz.
- Sekojiet, lai pudelītes pilinātājs nepieskartos acij vai plakstiņam, apkārtējām vietām vai citām virsmām. Tā var inficēt pilienus.
- Iepiliniet vienu pilienu izveidotajā “kabatiņā” (2. attēls).
- Pēc Brinzolamide/Timolol Accord iepilināšanas, uz 2 minūtēm, ar pirkstu uzspiediet uz acs iekšējā kaktiņa pie deguna (3. attēls). Tas palīdz apturēt Brinzolamide/Timolol Accord uzsūkšanos pārējās ķermeņa daļās.
- Atkārtojiet iepriekšējās darbības, ja nepieciešams pilināt arī otrā acī.
- Tūlīt pēc lietošanas cieši aizveriet pudelīti.
- Izlietojiet vienu pudelīti, pirms atvērt nākošo.

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja Jūs lietojat citus acu pilienus vai ziedi, ievērojiet starp abu zāļu lietošanu vismaz 5 minūšu intervālu. Acu ziedes jālieto pēdējās.

**Ja esat lietojis Brinzolamide/Timolol Accord vairāk nekā noteikts, izskalojiet tās ar siltu ūdeni.** Nepilniet vairāk zāļu, līdz nākošās devas reizei.

Jums var rasties palēnināta sirdsdarbība, pazemināts asinsspiediens, sirds mazspēja, apgrūtināta elpošana un var būt skarta Jūsu nervu sistēma.



**Ja esat aizmirsis lietot Brinzolamide/Timolol Accord,** turpiniet ar nākamo devu, kā iepilānots. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu izlaisto devu. Nelietojiet vairāk kā vienu pilienu slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.

**Ja pārtraucat lietot Brinzolamide/Timolol Accord,** nekonsultējoties ar ārstu, Jūsu acs iekšējais spiediens netiks kontrolēts, un tas var novest pie redzes zaudēšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

#### 4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

**Nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un konsultējieties ar ārstu,** ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem:

- izsitumi uz ādas, smaga ādas reakcija vai izteikts acs apsārtums un nieze. Šie varētu būt alerģiskas reakcijas simptomi (biežums nav zināms).
- sarkanīgi nepaaugstināti, mērķim līdzīgi vai apļveida plankumi uz ķermeņa, bieži ar tulznām centrā, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, dzimumorgānos un acīs. Pirms šiem nopietnajiem ādas izsitumiem var būt drudzis un gripai līdzīgi simptomi (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze).

Parasti Jūs varat turpināt pilienu lietošanu, izņemot, ja blakusparādības ir nopietnas. Ja esat nobažījies/nobažījiesies, aprunājieties ar ārstu vai farmaceitu. Nepārtrauciet lietot Brinzolamide/Timolol Accord, vispirms nekonsultējoties ar ārstu.

#### **Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):**

- **Blakusparādības acī:** acs virsmas iekaisums, neskaidra redze, acs kairinājuma pazīmes un simptomi (piemēram, smeldzoša sajūta, dedzināšana, nieze, asarošana, apsārtums), sāpes acī.
- **Vispārējas blakusparādības:** palēnināta sirdsdarbība, garšas traucējumi.

#### **Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):**

- **Blakusparādības acī:** radzenes erozija (bojājums acs ābola virsējā slānī), acs virsmas iekaisums ar virsmas bojājumu, iekaisums acs iekšpusē, radzenes iekrāsošanās, neparasta sajūta acīs, izdalījumi no acs, sausā acs, nogurušas acis, acs nieze, acs apsārtums, acs plakstiņa apsārtums.
- **Vispārējas blakusparādības:** samazināts balto asinsķermenīšu skaits, pazemināts asinsspiediens, klepus, asinis urīnā, ķermeņa vājums.

#### **Reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):**

- **Blakusparādības acī:** radzenes traucējumi, jutība pret gaismu, pastiprināta asarošana, kreveles uz acs plakstiņa.
- **Vispārējas blakusparādības:** miega traucējumi (bezmiags), sāpes rīklē, deguna tecēšana.

#### **Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):**

- **Blakusparādības acī:** acs alerģija, redzes traucējumi, redzes nerva bojājums, paaugstināts acs iekšējais spiediens, nosēdumi uz acs virsmas, samazināts acs jutīgums, konjunktīvas (acs baltuma) iekaisums vai infekcija, neparasta redze, redzes dubultošanās vai pavājināšanās, pastiprināta acs pigmentācija, acs virsmas izaugums, acs pietūkums, jutība pret gaismu, samazināta skropstu augšana vai to skaits, augšējo plakstiņu noslīdēšana (acs paliek pusaizvērtā stāvoklī), plakstiņu un plakstiņu dziedzeru iekaisums, iekaisums radzenē un asinsvadus saturošā slānī zem tīklenes atslāņošanās, kas rodas pēc filtrēšanas operācijas un var izraisīt redzes traucējumus, samazinātu radzenes jutību.
- **Sirds un asinsrite:** ritma vai ātruma izmaiņas sirdsdarbībā, palēnināts sirds ritms, sirdsklauves, kas ir sirds ritma traucējumu forma, neparasti paātrināta sirdsdarbība, sāpes krūtīs, samazināta sirds funkcija, sirdslēkme, paaugstināts asinsspiediens, samazināta asins pieplūdums smadzenēm, trieka, tūska (šķidrums uzkrāšanās), sastrēguma sirds mazspēja (sirds slimība ar elpas trūkumu un pēdu un kāju pietūkumu šķidrums uzkrāšanās dēļ), ekstremitāšu tūska, zems asinsspiediens, roku un kāju pirkstu, un reizēm arī citu ķermeņa daļu krāsas izmaiņas (Reino sindroms), aukstas rokas un kājas.
- **Elpošanas sistēma:** sašaurināti elpceļi plaušām (galvenokārt, pacientiem ar esošu slimību),

- elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana, saaukstēšanās simptomi, smaga sajūta krūtīs, deguna blakusdobumu infekcija, šķaudīšana, aizlikts deguns, sausums degunā, deguna asiņošana, astma, rīkles kairinājums.
- **Nervu sistēmas un vispārējas blakusparādības:** depresija, nakts murgi, atmiņas zudums, galvassāpes, nervozitāte, uzbudinātība, nogurums, drebuļi, neparasta sajūta, vājums, reibonis, miegainība, vispārējs vai izteikts nespēks, neparastas sajūtas līdzīgas tirpšanai, halucinācijas.
  - **Kuņģa-zarnu trakts:** nelabums, vemšana, caureja, gāzu uzkrāšanās zarnās vai diskomforta sajūta vēderā, iekaisums kaklā, sausa mute vai neparasta sajūta mutē, gremošanas traucējumi, sāpes vēderā.
  - **Asinsrite:** patoloģiski aknu analīžu rezultāti, palielināts hlorīdu līmenis vai samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits, kas redzams asins analīzēs.
  - **Alerģija:** pastiprināti alerģiskie simptomi, vispārējas alerģiskas reakcijas, tostarp zemādas pietūkums, kas var rasties, piemēram, uz sejas un ekstremitātēm un var nosprostot elpceļus, līdz ar to izraisot apgrūtinātu rīšanu vai elpošanu, nātrene, lokalizēti un vispārēji izsitumi, nieze, smagas dzīvībai bīstamas alerģiskas reakcijas.
  - **Ausis:** dzīkstēšana ausīs, reibonis vai griešanās sajūta.
  - **Āda:** izsitumi, ādas apsārtums vai iekaisums, neparasta vai pavājināta ādas jutība, matu izkrišana, balti sudrabainas krāsas izsitumi (psoriāzes tipa izsitumi) vai psoriāzes saasināšanās.
  - **Muskuļi:** vispārējas muguras, locītavu vai muskuļu sāpes, ko nav izraisījusi fiziska aktivitāte, muskuļu spazmas, sāpes ekstremitātēs, muskuļu vājums/nogurums, pastiprinās *myasthenia gravis* (muskuļu traucējumi) pazīmes un simptomi.
  - **Nieres:** nieru sāpes kā muguras lejas daļas sāpes, bieža urinēšana.
  - **Reproduktīvā funkcija:** seksuālā disfunkcija, pazemināts libido, seksuālās funkcijas traucējumi vīriešiem.
  - **Metabolisms:** zems cukura līmenis asinīs.
  - **Vispārējas blakusparādības:** sarkanīgi nepaaugstināti, mērķim līdzīgi vai aplūveida plankumi uz ķermeņa, bieži ar tulznām centrā, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē, degunā, dzimumorgānos un acīs, pirms kuriem var būt drudzis un gripai līdzīgi simptomi. Šie nopietnie ādas izsitumi var būt potenciāli bīstami dzīvībai (Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze).

### Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

### 5. Kā uzglabāt Brinzolamide/Timolol Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Lai novērstu infekcijas rašanos, izmetiet pudelīti 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas, un paņemiet jaunu pudelīti. Uzrakstiet atvēršanas datumu uz pudelītes un kastītes etiķetes tam norādītajā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicāriet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

### Ko Brinzolamide/Timolol Accord satur

- Aktīvās vielas ir brinzolamīds un timolols. Viens ml suspensijas satur 10 mg brinzolamīda un timolola maleātu, kas atbilst 5 mg timolola.
- Citas sastāvdaļas ir benzalkonija hlorīds (skatīt 2. punktu ‘Brinzolamide/Timolol Accord satur benzalkonija hlorīdu’), karbomērs, dinātrijs edetāts, mannīts (E421), attīrīts ūdens, nātrijs hlorīds, sālskābe un/vai nātrijs hidroksīds.

Sastāvā iekļauts neliels daudzums sālskābes un/vai nātrijs hidroksīda, lai saglabātu normālu skābuma līmeni (pH līmeni).

### Brinzolamide/Timolol Accord ārējais izskats un iepakojums

Brinzolamide/Timolol Accord ir šķidrums (balta vai pelēkbaltas krāsas suspensija), kas pieejams iepakojumā, kurā ietilpst 5 ml zema blīvuma polietilēna (ZBPE) pudelīte ar ZBPE ievietotu pilinātāju un augsta blīvuma polietilēna (ABPE) vāciņu, kurā iepildīti 5 ml suspensijas.

Kastītes satur 1,3 vai 6 pudelītes.

Visi iepakojumu lielumi tirgū var nebūt pieejami.

### Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare B.V.  
Winthontlaan 200  
3526 KV Utrecht  
Nīderlande

### Ražotājs

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.  
Rua Norberto de Oliveira 1-5  
Povoa De Santo Adriaio  
2620-111 Lisboa  
Portugāle

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Valsts nosaukums	Zāļu nosaukums
Zviedrija	Brinzolamide/Timolol Accord
Igaunija	Brinzolamide/Timolol Accord
Itālija	Brinzolamide e Timololo Accord
Latvija	Brinzolamide/Timolol Accord 10 mg/ml / 5 mg/ml acu pilieni, suspensija
Lietuva	Brinzolamide/Timolol Accord 10 mg/ml / 5 mg/ml akiņu lašai (suspensija)
Nīderlande	Brinzolamide/Timolol Accord 10 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, suspensie
Lielbritānija	Brinzolamide/Timolol Accord

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2023