

**Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam****Fluconazole Vitabalans 150 mg tabletes***fluconazolium***Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir Fluconazole Vitabalans un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Fluconazole Vitabalans lietošanas
3. Kā lietot Fluconazole Vitabalans
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Fluconazole Vitabalans
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

**1. Kas ir Fluconazole Vitabalans un kādam nolūkam to lieto**

Fluconazole Vitabalans pieder pie zāļu grupas, ko sauc par „pretsēnīšu līdzekļiem”. Aktīvā viela ir flukonazols.

Fluconazole Vitabalans lieto sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai, kā arī, lai pasargātu no inficēšanās ar kandidozi. Visbiežāk sēnīšu infekcijas izraisa rauga sēnīte *Candida*.

**Pieaugušie**

Ārsts var nozīmēt Jums šīs zāles sekojošu sēnīšu infekciju ārstēšanai:

- kriptokoku meningīts – sēnīšu infekcija smadzenēs;
- kokcidioidomikoze – bronhu-plaušu sistēmas slimība;
- infekcijas, ko izraisa *Candida*, un kas tiek atrastas asinsrites sistēmā, ķermeņa orgānos (piem., sirdī, plaušās) vai urīnizvades sistēmā;
- gļotādu piena sēnīte – infekcija, kas bojā mutes, rīkles gļotādu, un ar zobu protēžu lietošanu saistīts jēlums mutē;
- ģenitāliju piena sēnīte – maksts vai dzimumlocekļa infekcija;
- ādas infekcijas – piem., atlēta pēda, cirpējēde, cirkšņu sēnīte, nagu infekcija.

Fluconazole Vitabalans var tikt Jums nozīmēts arī:

- lai pasargātu no kriptokoku meningīta atkārtšanās;
- lai pasargātu no gļotādu piena sēnītes atkārtšanās;
- lai samazinātu maksts piena sēnītes atkārtēanos;
- lai izvairītos no inficēšanās ar *Candida* infekciju (ja Jums ir novājināta imunitāte un tā nedarbojas atbilstoši).

**Bērni un pusaudži (vecumā no 0 līdz 17 gadiem)**

Ārsts var nozīmēt Jums šīs zāles sekojošu sēnīšu infekciju ārstēšanai:

- gļotādu piena sēnīte – infekcija, kas bojā mutes, rīkles gļotādu;
- infekcijas, ko izraisa *Candida*, un kas tiek atrastas asinsrites sistēmā, ķermeņa orgānos (piem., sirdī, plaušās) vai urīnizvades sistēmā;

- kriptokoku meningīts – sēnīšu infekcija smadzenēs.

Fluconazole Vitabalans var tikt Jums nozīmēts arī:

- lai pasargātu Jūs no inficēšanās ar *Candida* sēnīšu slimībām (ja Jums ir novājināta imunitāte un tā nedarbojas atbilstoši);
- lai pasargātu no kriptokoku meningīta atkārtošanās.

## 2. Kas Jums jāzina pirms Fluconazol Vitabalans lietošanas

### Nelietojiet Fluconazole Vitabalans šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret flukonazolu, citām zālēm sēnīšu infekciju ārstēšanai vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
- ja Jūs lietojat astemizolu, terfenadīnu (antihistamīna līdzekļi alerģijas ārstēšanai);
- ja Jūs lietojat cisaprīdu (lieto kuņģa darbības traucējumu novēršanai);
- ja Jūs lietojat pimoziīdu (lieto garīgu slimību ārstēšanai);
- ja Jūs lietojat hinidīnu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai);
- ja Jūs lietojat eritromicīnu (antibiotisks līdzeklis infekciju ārstēšanai).

### Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Fluconazole Vitabalans lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

- ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi;
- ja Jūs ciešat no sirds slimības, ieskaitot sirds ritma traucējumus;
- ja Jums ir izmainīts kālija, kalcija vai magnija līmenis asinīs;
- ja Jums attīstās smagas ādas reakcijas (nieze, ādas apsārtums vai apgrūtināta elpošana);
- ja virsnieru dziedzeri neizstrādā pietiekamā daudzumā noteiktus steroīdos hormonus, piemēram, kortizolu, un Jums attīstās virsnieru mazspējas simptomi (hronisks vai ilgstošs nogurums, muskuļu vājums, apetītes zudums, svara samazināšanās, sāpes vēderā);
- ja sēnīšu infekcija nemazinās, jo iespējams, ka nepieciešama cita pretsēnīšu terapija;
- ja Jums pēc flukonazola lietošanas attīstās nopietni ādas izsitumi vai ādas lobīšanās, pūslīšu veidošanās un/vai ir mutes čūlas.

Saistībā ar flukonazola ārstēšanu ir ziņots par tādām nopietnām ādas reakcijām kā eozinofīlija un sistēmiski simptomi (DRESS). Pārtrauciet Fluconazole Vitabalans lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja novērojat kādu simptomu, kas attiecas uz šīm nopietnajām ādas reakcijām, kas aprakstītas 4.punktā.

### Citas zāles un Fluconazole Vitabalans

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

**Nekavējoties** pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat astemizolu, terfenadīnu (antihistamīns alerģiju ārstēšanai) vai cisaprīdu (lieto kuņģa darbības traucējumu gadījumā), vai pimoziīdu (lieto garīgu slimību ārstēšanai), vai hinidīnu (lieto sirds aritmiju ārstēšanai), vai eritromicīnu (antibiotisks līdzeklis infekciju ārstēšanai), jo tos nedrīkst lietot kopā ar Fluconazole Vitabalans (skatīt apakšpunktu „Nelietojiet Fluconazole Vitabalans šādos gadījumos”).

Ir zāles, kas var savstarpēji mijiedarboties ar Fluconazole Vitabalans. Pārliecinieties, vai ārsts ir informēts, ka Jūs lietojat kādu no tālāk minētajām zālēm:

- rifampicīns vai rifabutin (antibiotiskas infekciju ārstēšanai),
- abrocitinibs (lieto atopiskā dermatīta (atopiskās ekzēmas) ārstēšanai),
- alfentanils, fentanils (lieto kā anestēzijas līdzekli),

- amitriptilīns, nortriptilīns (lieto kā antidepresantu),
- amfotericīns B, vorikonazols (pretsēnīšu līdzeklis),
- zāles asins recekļu veidošanās novēršanai (varfarīns vai līdzīgas zāles),
- benzodiazepīni (midazolāms, triazolāms vai līdzīgas zāles), ko lieto, lai uzlabotu Jūsu miegu vai mazinātu trauksmi,
- karbamazepīns, fenitoīns (lieto krampju lēkmju ārstēšanai),
- nifedipīns, isradipīns, amlodipīns, verapamils, felodipīns un losartāns (lieto hipertensijai - augstam asinsspiedienam),
- olaparibs (lieto olnīcu vēža ārstēšanai),
- ciklosporīns, everolīms, sirolīms vai takrolīms (transplantāta atgrūšanas novēršanai),
- ciklofosfamīds, *Vinca* alkaloidi (vinkristīns, vinblastīns vai līdzīgas zāles), ko lieto vēža ārstēšanai,
- halofantrīns (lieto malārijas ārstēšanai),
- statīni (atorvastatīns, simvastatīns un fluvastatīns vai līdzīgas zāles), ko lieto augsta holesterīna līmeņa pazemināšanai,
- metadons (lieto sāpju novēršanai),
- celekoksibs, flurbiprofēns, naproksēns, ibuprofēns, lornoksikāms, meloksikāms, diklofenaks (nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL)),
- iekšķīgi lietojamie kontraceptīvie līdzekļi,
- prednizons (steroīds),
- zidovudīns, zināms arī kā AZT; sahinavīrs (lieto HIV inficētiem pacientiem),
- zāles diabēta ārstēšanai, tādas kā, hlorpropamīds, glibenklamīds, glipizīds vai tolbutamīds,
- teofilīns (lieto astmas kontrolei),
- tofacitinibs (lieto reimatoīdā artrīta ārstēšanai),
- tolvaptāns, ko lieto hiponatriēmijas (zema nātrija līmeņa asinīs) ārstēšanai vai arī lai aizkavētu nieru darbības pasliktināšanos,
- A vitamīns (uztura bagātinātājs),
- ivakaftors (monoterapijā vai kombinācijā ar citām zālēm, ko lieto cistiskās fibrozes ārstēšanai),
- amiodarons (lieto nevienmērīgas sirdsdarbības (aritmijas) ārstēšanai),
- hidrohlortiazīds (diurētisks līdzeklis),
- ibrutinibs (lieto asins vēža ārstēšanai),
- lurazidons (lieto šizofrēnijas ārstēšanai).

### **Fluconazole Vitabalans kopā ar uzturu un dzērienu**

Jūs varat lietot zāles kopā ar ēdienu vai starp ēdienreizēm.

### **Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte**

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums nevajadzētu lietot Fluconazole Vitabalans grūtniecības laikā, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, ja vien ārsts nav licis to darīt. Ja Jums iestājas grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā vai 1 nedēļas laikā pēc pēdējās devas lietošanas, sazinieties ar savu ārstu.

Flukonazola lietošana pirmā grūtniecības trimestra laikā var paaugstināt spontānā aborta risku. Flukonazola lietošana mazās devās grūtniecības pirmajā trimestrī var nedaudz palielināt risku, ka jaundzimušais var piedzimt ar iedzimtiem defektiem, kas var skart kaulus un/vai muskuļus.

Jūs varat turpināt barot bērnu ar krūti pēc vienreizējas 150 mg Fluconazole Vitabalans devas lietošanas.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, ja Jūs lietojat Fluconazole Vitabalans atkārtoti.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Vadot transportlīdzekli vai strādājot ar mehānismiem, jāņem vērā, ka dažreiz var uzņākt reibonis vai krampji.

**Fluconazole Vitabalans satur nātriju**

Fluconazole Vitabalans satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā tabletē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

**3. Kā lietot Fluconazole Vitabalans**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Tablete jānorij vesela, uzdzerot glāzi ūdens. Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai starp ēdienreizēm. Ieteicams lietot tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Ieteicamā šo zāļu deva dažādu infekciju ārstēšanai ir šāda:

**Pieaugušie**

<b>Indikācijas</b>	<b>Deva</b>
Lai ārstētu kriptokoku meningītu	400 mg pirmajā dienā, tad 200 mg līdz 400 mg vienu reizi dienā 6 līdz 8 nedēļas vai ilgāk, ja nepieciešams. Dažreiz deva tiek paaugstināta līdz 800 mg
Lai novērstu kriptokoku meningīta atkārtosanos	200 mg vienreiz dienā tik ilgi, līdz tiek nozīmēta lietošanas pārtraukšana
Lai ārstētu kokcidioidomikozi	200 mg līdz 400 mg vienreiz dienā no 11 mēnešiem līdz pat 24 mēnešiem vai ilgāk, ja nepieciešams. Dažreiz deva tiek paaugstināta līdz 800 mg
Lai ārstētu <i>Candida</i> izraisītas iekšējās sēnīšu infekcijas	800 mg pirmajā dienā, tad 400 mg vienreiz dienā, līdz tiek nozīmēta lietošanas pārtraukšana
Lai ārstētu gļotādu infekcijas, kas bojā mutes, rīkles gļotādu, un ar zobu protēžu lietošanu saistītu jēlumu mutē	200 mg līdz 400 mg pirmajā dienā, tad pa 100 mg līdz 200 mg vienreiz dienā, līdz tiek nozīmēta lietošanas pārtraukšana
Lai ārstētu gļotādu piena sēnīti – deva atkarīga no infekcijas lokalizācijas vietas	50 mg līdz 400 mg vienreiz dienā no 7 līdz 30 dienām, līdz tiek nozīmēta lietošanas pārtraukšana
Lai novērstu gļotādu infekciju atkārtosanos, kas bojā mutes un rīkles gļotādu	100 mg līdz 200 mg vienreiz dienā vai 200 mg trīs reizes nedēļā tik ilgi, kamēr pastāv inficēšanās risks
Lai ārstētu ģenitāliju piena sēnīti	150 mg kā vienreizēja deva
Lai samazinātu maksts piena sēnītes atkārtosanos	150 mg katru trešo dienu, kopā 3 devas (1., 4. un 7. dienā), un tad vienreiz nedēļā 6 mēnešus tik ilgi, kamēr pastāv inficēšanās risks
Lai ārstētu ādas un nagu sēnīšu infekcijas	Atkarībā no infekcijas vietas: 50 mg vienreiz dienā, 150 mg vienreiz nedēļā, no 300 līdz 400 mg vienreiz nedēļā 1 līdz 4 nedēļas (Atlēta pēdas gadījumā līdz pat 6 nedēļām, nagu infekcijas gadījumā tik ilgi, kamēr bojātais nags ir atjaunojies)

Lai pasargātu Jūs no <i>Candida</i> izraisītām infekcijām (ja Jums ir novājināta imūnā sistēma un tā nedarbojas atbilstoši)	200 mg līdz 400 mg vienreiz dienā tik ilgi, kamēr Jums pastāv inficēšanās risks
---	---

**Pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem**

Ievērojiet ārsta nozīmēto devu (pieaugušo vai bērnu devas).

**Bērni līdz 11 gadu vecumam**

Maksimālā dienas deva bērniem ir 400 mg dienā.

Ārsts nozīmēs piemērotākās flukonazola zāļu formas lietošanu atkarībā no vecuma, ķermeņa masas un devas. Jaundzimušajiem un bērniem var būt piemērota citu zāļu formu lietošana, kad ar tabletes lietošanu nevar iegūt precīzu nozīmēto devu.

Devu tiks noteikta, ņemot vērā bērna ķermeņa masu (kilogramos).

Indikācijas	Dienas deva
<i>Candida</i> izraisīta gļotādu piena sēnīte un rīkles infekcijas – deva un ārstēšanas ilgums atkarīgs no infekcijas smaguma un lokalizācijas	3 mg uz ķermeņa masas kg vienreiz dienā (pirmajā dienā var tikt nozīmēti 6 mg uz ķermeņa masas kg)
Kriptokoku meningīts vai <i>Candida</i> izraisītas iekšējās sēnīšu infekcijas	6 mg līdz 12 mg uz ķermeņa masas kg vienreiz dienā
Lai novērstu kriptokoku meningītu atkārtosanos	6 mg uz ķermeņa masas kg vienreiz dienā
Lai pasargātu bērnu no <i>Candida</i> izraisītām infekcijām (ja viņu imunitāte nedarbojas atbilstoši)	3 mg līdz 12 mg uz ķermeņa masas kg vienreiz dienā

**Lietošana bērniem vecumā no 0 līdz 4 nedēļām**

Lietošana bērniem 3 līdz 4 nedēļu vecumā:

Tikpat liela deva kā iepriekš minēts, tikai lieto reizi divās dienās. Maksimālā deva ir 12 mg uz ķermeņa masas kg ik pēc 48 stundām.

Lietošana bērniem vecumā līdz 2 nedēļām:

Tikpat liela deva kā iepriekš minēts, tikai lieto reizi trijās dienās. Maksimālā deva ir 12 mg uz ķermeņa masas kg ik pēc 72 stundām.

**Gados vecāki pacienti**

Ja nav nieru darbības traucējumu, jālieto parastā pieaugušajiem paredzētā deva.

**Pacienti ar nieru darbības traucējumiem**

Ārsts var mainīt Jums nepieciešamo devu, atkarībā no Jūsu nieru darbības.

**Ja esat lietojis Fluconazole Vitabalans vairāk nekā noteikts**

Pārāk daudz tablešu lietošana vienā reizē var izraisīt sliktu pašsajūtu. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Iespējamās pārdozēšanas simptomi var būt nereālu lietu sadzirdēšana, redzēšana, sajūšana un iedomas (halucinācijas un paranoidā uzvedība). Var būt nepieciešama simptomātiska terapija (atbalsta terapija un nepieciešamības gadījumā arī kuņģa skalošana).

**Ja esat aizmirsis lietot Fluconazole Vitabalans**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja Jūs esat aizmirsis lietot nepieciešamo devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Ja gandrīz ir pienācis laiks nākamai devai, nelietojiet aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

#### 4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažiem cilvēkiem attīstās **alerģiskas reakcijas**, tomēr nopietnas alerģiskas reakcijas novērotas reti. Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. **Nekavējoties pastāstiet ārstam**, ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem:

- pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana vai spiedoša sajūta krūtīs,
- plakstiņu, sejas vai lūpu tūska,
- visa ķermeņa nieze, ādas apsārtums vai niezoši sarkani plankumi,
- izsitumi uz ādas,
- smagas ādas reakcijas, kā izsitumi, kas izraisa pūšļu veidošanos (tas var skart muti un mēli).

Pārtrauciet Fluconazole Vitabalans lietošanu un **nekavējoties** meklējiet medicīnisku palīdzību, ja novērojat kādu no sekojošiem simptomiem:

- plaši izsitumi, augsta ķermeņa temperatūra un palielināti limfmezgli (DRESS sindroms vai paaugstinātas jutības pret zālēm sindroms).

Fluconazole Vitabalans var ietekmēt aknu darbību. Aknu darbības traucējumu pazīmes ir sekojošas:

- nogurums,
- ēstgribas zudums,
- vemšana,
- ādas un acu baltumu dzelte.

Ja parādās kāda no šīm pazīmēm, pārtrauciet Fluconazole Vitabalans lietošanu un **nekavējoties pastāstiet to ārstam**.

#### Citas blakusparādības:

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- galvassāpes,
- diskomforta sajūta kuņģī, caureja, slikta dūša, vemšana,
- izmaiņas asins analīzēs, kas nosaka aknu darbību,
- izsitumi.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- samazināts sarkano asins šūnu skaits, kas var izraisīt ādas bālumu, vājumu vai elpas trūkumu,
- samazināta ēstgriba,
- bezmiegs, miegainība,
- krampji, galvas reibonis, griešanās sajūta, tirpšana, durstīšanas vai nejutīguma sajūta, garšas sajūtas traucējumi,
- aizcietējums, apgrūtināta gremošana, gāzu uzkrāšanās vēderā, sausa mute,
- muskuļu sāpes,
- aknu bojājums, ādas un acu dzelte,
- čulgas, pūslīši uz ādas (nātrene), nieze, pastiprināta svīšana,
- nogurums, vispārēja slikta pašsajūta, drudzis.

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

- samazināts balto asins šūnu, kas palīdz cīnīties pret infekcijām, skaits un to asins šūnu skaits, kas palīdz apturēt asiņošanu,
- sarkanās vai violetās ādas krāsas izmaiņas, ko var izraisīt zems trombocītu skaits vai citas asins šūnu izmaiņas,
- izmaiņas asins bioķīmiskajos rādītājos (augsts holesterīna, lipīdu līmenis),
- zems kālija līmenis asinīs,
- trīce,
- izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), sirds ritma traucējumi,
- aknu mazspēja,
- alerģiskas reakcijas (dažreiz nopietnas), tajā skaitā, plaši izsitumi pūslīšu veidā un ādas lobīšanās, nopietnas ādas reakcijas, lūpu vai sejas pietūkums,
- matu izkrišana.

Biežums nav zināms, bet blakusparādības var rasties (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

- paaugstinātas jutības reakcijas ar ādas izsitumiem, drudzis, dziedzeru pietūkums, noteikta veida balto asins šūnu skaita palielināšanās (eozinofīlija) un iekšējo orgānu iekaisums (aknu, plaušu, sirds, nieru un resnās zarnas); (zāļu reakcija vai izsitumi ar eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem (DRESS)).

### **Zinošana par blakusparādībām**

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv). Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

## **5. Kā uzglabāt Fluconazole Vitabalans**

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP:". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

### **Ko Fluconazole Vitabalans satur**

- Aktīvā viela ir flukonazols.
- Katra tablete satur 150 mg flukonazola.
- Citas sastāvdaļas ir:  
mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta ciete, kroskarmelozes nātrijs, magnija stearāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds.

### **Fluconazole Vitabalans ārējais izskats un iepakojums**

Balta, kapsulas formas izliekta tablete ar dalījuma līniju vienā pusē. Izmērs: platums 7,5 mm, garums 18 mm.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

*Iepakojuma lielumi:*

pa 1, 2, 4, 6, 12, 30, 100 tabletēm blisteriepakojumos (PVH/Al) vai 12, 30, 100 tabletēm pudelēs (AB-PE plastmasas trauciņš (pa 50 ml vai 150 ml) ar ZB-PE plastmasas aizdari).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks**

Vitabalans Oy  
Varastokatu 8  
FI-13500 Hämeenlinna  
Somija  
Tel: +358 (3) 615600  
Fax: +358 (3) 6183130

**Ražotājs:**

Vitabalans Oy  
Varastokatu 7-9  
FI-13500 Hämeenlinna  
Somija

**Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:**

Fluconazole Vitabalans: Čehija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, Slovākija  
Fluconazol Vitabalans: Dānija, Vācija, Somija, Ungārija, Norvēģija, Zviedrija  
Flukonazol Vitabalans: Slovēnija

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2023-04-20**

**Citi informācijas avoti**

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē.