



Svarīga drošuma informācija veselības aprūpes speciālistiem par Venclyxto[®] un ALS

Šis pacients lieto Venclyxto[®] HLL ārstēšanai, kas terapijas pirmajās 5 nedēļās var izraisīt audzēja līzes sindromu (ALS).

- ✓ Pārbaudiet asins ķīmisko sastāvu: kālijs, urīnskābe, fosfors, kalcijs un kreatinīns.
- ✓ Nekavējoties koriģējiet asins ķīmiskā sastāva novirzes.
Tās var būt letālas, ja netiks ārstētas.
- ✓ Ja Jums ir aizdomas par ALS, nekavējoties sazinieties ar ārstu, kas norādīts šajā kartītē.

Lūdzu, iepazīstieties ar zāļu aprakstu vai arī sazinieties ar AbbVie, rakstot e-pastu AbbVieBalticsPV@abbvie.com vai pa tālruni +371 67605000, lai uzzinātu vairāk, kā arī lai saņemtu pacienta kartītes papildu eksemplārus.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādam novērotajām blakusparādībām.



Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Pacienti”. Tālrunis informācijai: 67078400.

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Pacienta kartīte

Informācija par drošumu pacientiem ar hronisku limfoleikozi, kuri lieto Venclyxto[®] (*venetoclaxum*)

Venclyxto lieto, lai ārstētu pacientus, kuriem ir hroniska limfoleikoze (HLL). Šajā kartītē ir informācija, kas Jums jāzina par audzēju līzes sindromu un Venclyxto[®].



- Vienmēr nēsāiet pacienta kartīti līdzī.
- Parādiet to Jūsu aprūpē iesaistītajiem ārstiem un ja vērsaties neatliekamās palīdzības nodaļā.
- Vienmēr lietojiet Venclyxto[®] tieši tā, kā ārsts Jums teicis.

Kas man ir jāzina par ALS?

Ārstēšanas laikā Jums var paaugstināties dažu sāļu (piemēram, kālija un urīnskābes) līmenis asinīs. Tas terapijas pirmajās 5 nedēļās var izraisīt stāvokli, ko sauc **audzēja līzes sindromu** (ALS).

ALS simptomi:

- drudzis vai drebuļi;
- slikta dūša vai vemšana;
- apjukums;
- elpas trūkums;
- neregulāra sirdsdarbība;
- tumšs vai duļķains urīns;
- neparasta noguruma sajūta;
- muskuļu vai locītavu sāpes;
- krampji vai krampju lēkmes;
- vēdera sāpes un pūšanās.

Kā rīkoties, ja man radušies ALS simptomi?

Ja ārstēšanas laikā Jūs novērojat kādu no ALS simptomiem, Jums:

- ⚠ **nekavējoties jāsazinās ar ārstu vai jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības un**
- ⚠ **jāpārtrauc lietot Venclyxto®**

Vairāk informācijas lasiet zāļu lietošanas instrukcijā.

Kā es varu samazināt ALS risku?



Dzeriet vismaz 1,5 - 2 litrus ūdens katru dienu:

- ✓ 2 dienas pirms pirmās devas un
- ✓ pirmās devas saņemšanas dienā, kā arī
- ✓ katru dienu terapijas pirmo 5 nedēļu laikā.

Dzerot daudz ūdens, tiek veicināta lielu daudzumu sāļu izvade no asinīm ar urīnu.



Ierodieties uz **asins analīžu veikšanai** plānotajām vizītēm, jo tās palīdzēs Jūsu ārstam atklāt ALS.



Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Venclyxto® sāciet

lietot citas zāles, kas palīdzēs novērst asins sāļu (urīnskābes) uzkrāšanos organismā. Lietojiet zāles, kā norādījis ārsts.

Svarīga kontaktinformācija

Mans vārds, uzvārds:

Mana ārkārtas kontaktpersona (vārds, uzvārds un tālrunis):

Ārsts - Venclyxto® parakstītājs:

Ārsta kontakttālrunis